warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Spis treści


1. Agrest - konsumpcyjne
2. Arbuz
3. Aronia
4. Bobik
5. Bobowate drobnonasienne
6. Bobowate grubonasienne
7. Borówka - konsumpcyjne
8. Bób
9. Brokuł
10. Brukiew
11. Brzoskwinia - konsumpcyjne
12. Burak cukrowy
13. Burak ćwikłowy na korzenie
14. Burak na nasiona
15. Burak pastewny ba korzeń
16. Cebula na spożycie
17. Chmiel z 64 pędami
18. Chmiel z 96 pędami
19. Chrzan
20. Cukinia
21. Cykoria
22. Czereśnia - konsumpcyjne
23. Czosnek na spożycie
24. Dynia
25. Facelia
26. Fasola
27. Groch
28. Gruszka - konsumpcyjne
29. Gryka
30. Jabłko - konsumpcyjne
31. Jabłko - przemysłowe
32. Jeżyna - konsumpcyjne
33. Jęczmień jary - ziarno
34. Jęczmień ozimy - ziarno
35. Kabaczki
36. Kalafior na spożycie
37. Kalarepa na spożycie
38. Kapusta czerwona na spożycie
39. Kapusta na spożycie
40. Kapusta pekińska
41. Konopie
42. Koper na zielono
43. Kukurydza cukrowa
44. Kukurydza kiszonka
45. Kukurydza na ziarno
46. Kukurydza na zieloną masę
47. Len
48. Lędźwian
49. Łubin
50. Mak
51. Malina - konsumpcyjne
52. Marchew pastewna
53. Marchew spożywcza
54. Melon
55. Morela - konsumpcyjne
56. Nektarynka
57. Ogórek
58. Orzech - konsumpcyjne
59. Owies - ziarno
60. Papryka
61. Pasternak
62. Peluszka
63. Pietruszka na spożycie
64. Pomidor
65. Por na spożycie
66. Porzeczka - konsumpcyjne
67. Poziomka
68. Pszenica jara - ziarno
69. Pszenica ozima - ziarno
70. Pszenżyto - ziarno
71. Rzepa
72. Rzepak jary
73. Rzepak ozimy
74. Rzepik
75. Rzodkiew
76. Rzodkiewka
77. Sałata na spożycie
78. Seler naciowy
79. Seler na korzenie
80. Słonecznik
81. Soczewica
82. Soja
83. Szczypiorek na liście (z nasion)
84. Śliwa - konsumpcyjne
85. Śliwa - przemysłowe
86. Truskawka - konsumpcyjne
87. Tytoń ciemny
88. Tytoń jasny
89. Winogrono - konsumpcyjne
90. Wiśnia - konsumpcyjne
91. Wyka
92. Ziemniak średniopóźny i późny
93. Ziemniak wczesny i średniowczesny
94. Żyto hybrydowe
95. Żyto jare - ziarno
96. Żyto ozime - ziarno

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 1. Agrest - konsumpcyjne

### Tabela numer 1146 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1147 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1148 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1149 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1150 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6759 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

### Tabela numer 2277 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2278 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 2279 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 2280 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2281 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4324 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 4325 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 4326 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 4327 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4328 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5644 - Agrest - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## 2. Arbuz

### Tabela numer 7148 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7149 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7150 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7151 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7155 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7152 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7153 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7154 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7156 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7157 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7158 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7159 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7160 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7161 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7162 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7163 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7164 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7165 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7166 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7167 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7168 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7169 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7170 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7171 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7172 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7173 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7174 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7175 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7232 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7233 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7234 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7235 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7239 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7236 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7237 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7238 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7240 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7241 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7242 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7243 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7244 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7245 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7246 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7247 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7248 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7249 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7250 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7251 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7252 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7253 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7254 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7255 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7256 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7257 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7258 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7259 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7176 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7177 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7178 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7179 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7183 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7180 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7181 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7182 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7184 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7185 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7186 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7187 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7188 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7189 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7190 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7191 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7192 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7193 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7194 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7195 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7196 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7197 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7198 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7199 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7200 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7201 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7202 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7203 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7204 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7205 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7206 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7207 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7211 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7208 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7209 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7210 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7212 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7213 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7214 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7215 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7216 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7217 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7218 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7219 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7220 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7221 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7222 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7223 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7224 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7225 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7226 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7227 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7228 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7229 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7230 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7231 - Arbuz

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 3. Aronia

### Tabela numer 6752 - Aronia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

### Tabela numer 5637 - Aronia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## 4. Bobik

### Tabela numer 1950 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1951 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1952 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 1953 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 1954 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1955 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 1956 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 1957 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1958 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1959 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 1960 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 1961 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1962 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1963 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1964 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1965 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 1966 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1967 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1968 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 1969 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1970 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1971 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1972 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6379 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6380 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6381 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 6382 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6383 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6384 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 6385 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 6386 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6387 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6388 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 6389 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 6390 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6391 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6392 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6393 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6394 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6395 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6396 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6397 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6398 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6399 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6400 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6401 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3080 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3081 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3082 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 3083 - Bobik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3084 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3085 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 3086 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 3087 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3088 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3089 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 3090 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 3091 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3092 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3093 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3094 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3095 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 3096 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3097 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3098 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 3099 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3100 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3101 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3102 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5127 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5128 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5129 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5130 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5131 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5132 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5133 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5134 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5135 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5136 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5137 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5138 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5139 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5140 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5141 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5142 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5143 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5144 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5145 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

### Tabela numer 5146 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5147 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 5148 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 5149 - Bobik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 5. Bobowate drobnonasienne

### Tabela numer 8227 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 8228 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8229 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 8230 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 8231 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8232 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 8233 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 8234 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8235 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8236 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 8237 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8238 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8239 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8240 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8241 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8242 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8243 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8244 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8245 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 8246 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8247 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8248 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8249 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8296 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8297 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8298 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 8299 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 8300 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8301 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8302 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 8303 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8304 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8305 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 8306 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 8307 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8308 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8309 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8310 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8311 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8312 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8313 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8314 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 8315 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8316 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8317 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8318 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8250 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8251 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8252 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 8253 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 8254 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8255 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 8256 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 8257 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8258 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8259 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8260 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 8261 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8262 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8263 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8264 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8265 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8266 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8267 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8268 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8269 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8270 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8271 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8272 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8273 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8274 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8275 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 8276 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 8277 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8278 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 8279 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 8280 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8281 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8282 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 8283 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 8284 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8285 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8286 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8287 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8288 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8289 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8290 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8291 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 8292 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8293 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8294 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8295 - Bobowate drobnonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 6. Bobowate grubonasienne

### Tabela numer 8135 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 8136 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 8137 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 8138 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 8139 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Tabela numer 8140 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

### Tabela numer 8141 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

### Tabela numer 8142 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8143 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8144 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 8145 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 8146 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8147 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8148 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8149 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8150 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8151 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8152 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8153 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 8154 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8155 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8156 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8157 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8204 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8205 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8206 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8207 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 8208 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8209 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 8210 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 8211 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8212 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8213 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 8214 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 8215 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8216 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8217 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8218 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8219 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8220 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8221 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8222 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 8223 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8224 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8225 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8226 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8158 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8159 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8160 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 8161 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 8162 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8163 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 8164 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8165 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8166 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8167 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 8168 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 8169 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8170 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8171 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8172 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8173 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8174 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8175 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8176 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 8177 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8178 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8179 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8180 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8181 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 8182 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8183 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 8184 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 8185 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8186 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 8187 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 8188 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8189 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8190 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 8191 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8192 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 8193 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8194 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8195 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8196 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8197 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 8198 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8199 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 8200 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 8201 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 8202 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 8203 - Bobowate grubonasienne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 7. Borówka - konsumpcyjne

### Tabela numer 2272 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2273 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 2274 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 2275 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2276 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6758 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3402 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3403 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 3404 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 3405 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3406 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5449 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5450 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 5451 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 5452 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5453 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5643 - Borówka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## 8. Bób

### Tabela numer 1152 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1153 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1154 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 1155 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 1156 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Tabela numer 1157 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

### Tabela numer 1158 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1159 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1160 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1161 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 1162 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 1163 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1164 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1165 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1166 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1167 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1168 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1169 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1170 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 1171 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1172 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1173 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1174 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5657 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5658 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5659 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5660 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5661 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5662 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5663 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5664 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5665 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5666 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5667 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5668 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5669 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5670 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5671 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5672 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5673 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5674 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5675 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 5676 - Bób

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5677 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5678 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5679 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2282 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2283 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2284 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 2285 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2286 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2287 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2288 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 2289 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2290 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2291 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 2292 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 2293 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2294 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2295 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2296 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2297 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2298 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2299 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2300 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2301 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2302 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2303 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2304 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4329 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4330 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4331 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 4332 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 4333 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 4334 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 4335 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 4336 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 4337 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 4338 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4339 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 4340 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 4341 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4342 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4343 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4344 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 4345 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 4346 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4347 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4348 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4349 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 4350 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 4351 - Bób

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 9. Brokuł

### Tabela numer 2209 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

### Tabela numer 2210 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

### Tabela numer 2211 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

### Tabela numer 2212 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2213 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 2214 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2215 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

## Tabela numer 2216 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2217 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2218 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 2219 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6638 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

## Tabela numer 6639 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6640 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6641 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 6642 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 6643 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6644 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

## Tabela numer 6645 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6646 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6647 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6648 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3339 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

## Tabela numer 3340 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

## Tabela numer 3341 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 3342 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 3343 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 3344 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 3345 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

## Tabela numer 3346 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3347 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3348 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 3349 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5386 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

## Tabela numer 5387 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

## Tabela numer 5388 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5389 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 5390 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5391 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5392 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5393 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5394 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5395 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 5396 - Brokuł

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 10. Brukiew

### Tabela numer 2167 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2168 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2169 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

### Tabela numer 2170 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2171 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 2172 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2173 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2174 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2175 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6596 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6597 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6598 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 6599 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6600 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 6601 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6602 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6603 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 6604 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3297 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3298 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3299 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 3300 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3301 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 3302 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 3303 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3304 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 3305 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5344 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5345 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5346 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 5347 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5348 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

### Tabela numer 5349 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

### Tabela numer 5350 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5351 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

### Tabela numer 5352 - Brukiew

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 11. Brzoskwinia - konsumpcyjne

### Tabela numer 1175 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1176 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1177 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1178 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1179 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6755 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 50 | 75 | 80 |

## Tabela numer 2305 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2306 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2307 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2308 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2309 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4352 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4353 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 4354 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4355 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4356 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5640 - Brzoskwinia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 50 | 75 | 80 |

## 12. Burak cukrowy

### Tabela numer 1180 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1181 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1182 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

### Tabela numer 1183 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

### Tabela numer 1184 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

### Tabela numer 1185 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1186 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1187 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 1188 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5680 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5681 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5682 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 5683 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 5684 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 5685 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5686 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5687 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 5688 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2310 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2311 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2312 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 2313 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 2314 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 2315 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2316 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2317 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2318 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4357 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4358 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4359 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 4360 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 4361 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 4362 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4363 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4364 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

### Tabela numer 4365 - Burak cukrowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 13. Burak ćwikłowy na korzenie

### Tabela numer 1189 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1190 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 1191 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |

### Tabela numer 1192 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |

### Tabela numer 1193 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1194 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1195 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1196 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 1197 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5689 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5690 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5691 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |

## Tabela numer 5692 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5693 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5694 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5695 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5696 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 5697 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2319 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2320 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2321 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2322 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2323 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2324 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2325 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2326 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2327 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4366 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4367 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 4368 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |

## Tabela numer 4369 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4370 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4371 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

### Tabela numer 4372 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4373 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

### Tabela numer 4374 - Burak ćwikłowy na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 14. Burak na nasiona

### Tabela numer 2111 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

### Tabela numer 2112 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

### Tabela numer 2113 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

### Tabela numer 2114 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2115 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2116 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 2117 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 2118 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2119 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2120 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2121 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 2122 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2123 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2124 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2125 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2126 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2127 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2128 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2129 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6540 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

## Tabela numer 6541 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6542 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6543 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6544 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6545 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 6546 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 6547 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6548 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6549 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6550 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 6551 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6552 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6553 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6554 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6555 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6556 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6557 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6558 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 3241 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

## Tabela numer 3242 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3243 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 3244 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3245 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 3246 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 3247 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 3248 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 3249 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3250 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 3251 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3252 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3253 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 3254 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3255 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3256 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3257 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 3258 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3259 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5288 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5289 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5290 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 5291 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5292 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5293 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 5294 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5295 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5296 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5297 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5298 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 5299 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5300 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5301 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5302 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5303 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5304 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 5305 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5306 - Burak na nasiona

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 15. Burak pastewny ba korzeń

### Tabela numer 2130 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

### Tabela numer 2131 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

### Tabela numer 2132 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

### Tabela numer 2133 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

### Tabela numer 2134 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 2135 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

### Tabela numer 2136 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

### Tabela numer 2137 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2138 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2139 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2140 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 2141 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2142 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2143 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2144 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2145 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2146 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2147 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2148 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6559 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

## Tabela numer 6560 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6561 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 6562 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6563 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6564 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 6565 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6566 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6567 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6568 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6569 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 6570 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6571 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6572 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6573 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6574 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6575 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6576 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6577 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 3260 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

## Tabela numer 3261 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 3262 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 3263 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3264 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 3265 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3266 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 3267 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 3268 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3269 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 3270 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 3271 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3272 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 3273 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3274 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3275 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3276 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 3277 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3278 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5307 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 47 | 55 |

## Tabela numer 5308 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5309 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 5310 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój pędów i kwiatostanu 51 - początek wzrostu pędu głównego; 59 - widoczne pierwsze liście podkwiatkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5311 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5312 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 5313 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5314 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5315 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty; 69 - koniec kwitnienia, widoczne zawiązki owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5316 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5317 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 5318 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5319 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5320 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-75, OPIS: Rozwój kłębków (owoców) 71 - początek rozwoju kłębków; 75 - owocnia zielona, bielmo nasion konsystencji mlecznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5321 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5322 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

### Tabela numer 5323 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 5324 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5325 - Burak pastewny ba korzeń

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-89, OPIS: Dojrzewanie 81 - poczatek dojrzewania, kłębki zielono-brązowe; 89 - pełna dojrzałość, kłębki twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 16. Cebula na spożycie

### Tabela numer 1198 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1199 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1201 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1202 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1203 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1205 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 1206 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1207 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1209 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1210 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 5698 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5699 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5700 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5701 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 5702 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5703 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 5704 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 5705 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5706 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5707 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 2328 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2329 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2331 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |

## Tabela numer 2332 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2333 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2335 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2336 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2337 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2339 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2340 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4375 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4376 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4377 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 4379 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4380 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4382 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 4383 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4384 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4386 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4387 - Cebula na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## 17. Chmiel z 64 pędami

### Tabela numer 1 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 21% | 21% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 22% | 22% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 32% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 40% |

### Tabela numer 2 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 31% | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 50% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% |

### Tabela numer 3 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 36% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 38% | 39% | 40% | 42% | 44% | 45% | 46% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 57% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 59% | 60% | 61% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% |

### Tabela numer 4 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 90% |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |

## Tabela numer 6 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 21% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% |

## Tabela numer 7 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

## Tabela numer 8 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 9 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 21% | 21% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 22% | 22% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 32% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 40% |

## Tabela numer 10 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 31% | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 50% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% |

## Tabela numer 11 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 36% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 38% | 39% | 40% | 42% | 44% | 45% | 46% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 57% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 59% | 60% | 61% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% |

## Tabela numer 12 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 90% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 13 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |

## Tabela numer 14 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 21% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% |

## Tabela numer 15 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

## Tabela numer 16 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 17 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 21% | 21% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 22% | 22% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 32% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 40% |

## Tabela numer 18 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 31% | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 50% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% |

## Tabela numer 19 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 36% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 38% | 39% | 40% | 42% | 44% | 45% | 46% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 57% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 59% | 60% | 61% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% |

## Tabela numer 20 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 90% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 21 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |

## Tabela numer 22 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 21% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% |

## Tabela numer 23 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

## Tabela numer 24 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 25 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 21% | 21% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 22% | 22% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 32% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 40% |

## Tabela numer 26 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 31% | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 50% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% |

## Tabela numer 27 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 36% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 38% | 39% | 40% | 42% | 44% | 45% | 46% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 57% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 59% | 60% | 61% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% |

## Tabela numer 28 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 90% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 29 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |

## Tabela numer 30 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 21% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% |

## Tabela numer 31 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

## Tabela numer 32 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 41 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 21% | 21% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 22% | 22% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 32% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 40% |

## Tabela numer 42 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 31% | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 50% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% |

## Tabela numer 43 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 36% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 38% | 39% | 40% | 42% | 44% | 45% | 46% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 57% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 59% | 60% | 61% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% |

## Tabela numer 44 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 90% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 45 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |

## Tabela numer 46 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 21% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% |

## Tabela numer 47 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

## Tabela numer 48 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 33 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 21% | 21% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 22% | 22% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 32% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 40% |

## Tabela numer 34 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 31% | 32% | 33% | 34% | 36% | 38% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 45% | 47% | 49% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 50% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% |

## Tabela numer 35 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17% | 18% | 19% | 20% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 36% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 38% | 39% | 40% | 42% | 44% | 45% | 46% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 57% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 59% | 60% | 61% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 80% |

## Tabela numer 36 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 64% | 65% | 67% | 69% | 71% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 89% | 90% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 37 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 13% | 14% | 15% | 17% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 19% | 20% | 22% | 23% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 55% | 57% | 59% | 61% | 63% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 100% |

## Tabela numer 38 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 21% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 46% | 48% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 82% | 84% | 86% | 88% | 90% | 94% | 96% | 98% | 100% |

## Tabela numer 39 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

## Tabela numer 40 - Chmiel z 64 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 24% | 26% | 28% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 46% | 47% |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 18. Chmiel z 96 pędami

### Tabela numer 97 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 35% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 39% | 39% | 40% | 40% | 40% |

### Tabela numer 98 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 29% | 30% | 31% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 32% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 39% | 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% |

### Tabela numer 99 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 43% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% |

### Tabela numer 100 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 101 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 102 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 103 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 104 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | | | | | Przyczyna | | Grad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 105 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 35% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 39% | 39% | 40% | 40% | 40% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 106 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 29% | 30% | 31% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 32% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 39% | 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% |

## Tabela numer 107 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 43% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% |

## Tabela numer 108 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |

## Tabela numer 109 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 110 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 111 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 112 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | | | | | Przyczyna | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 113 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 35% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 39% | 39% | 40% | 40% | 40% |

## Tabela numer 114 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 29% | 30% | 31% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 32% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 39% | 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% |

## Tabela numer 115 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 43% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 116 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |

## Tabela numer 117 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 118 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 119 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 120 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | | | | | Przyczyna | | Susza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 121 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 35% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 39% | 39% | 40% | 40% | 40% |

## Tabela numer 122 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 29% | 30% | 31% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 32% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 39% | 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% |

## Tabela numer 123 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 43% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% |

## Tabela numer 124 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |

## Tabela numer 125 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 126 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 127 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 128 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | | | | | Przyczyna | | Huragan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 137 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 35% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 39% | 39% | 40% | 40% | 40% |

## Tabela numer 138 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 29% | 30% | 31% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 32% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 39% | 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 139 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 43% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% |

## Tabela numer 140 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |

## Tabela numer 141 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 142 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 143 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 144 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | | | | | Przyczyna | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## Tabela numer 129 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 - Rozwój liści (BBCH od 11 do 19) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 13% | 13% | 14% | 14% | 15% | 15% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | 20% | 21% | 21% | 21% | 22% | 22% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 35% | 35% | 35% | 36% | 36% | 36% | 37% | 37% | 37% | 38% | 38% | 38% | 39% | 39% | 39% | 40% | 40% | 40% |

## Tabela numer 130 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 - Tworzenie pędów bocznych (BBCH od 21 do 29) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 15% | 16% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16% | 17% | 17% | 18% | 18% | 19% | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 24% | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 29% | 30% | 31% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 32% | 33% | 33% | 34% | 34% | 35% | 35% | 36% | 36% | 37% | 37% | 38% | 38% | 39% | 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 43% | 44% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 49% | 50% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 54% | 55% | 55% | 56% | 57% | 57% | 58% | 58% | 59% | 59% | 60% | 60% |

## Tabela numer 131 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 - Wydłużanie się pędów głównych 3,5 do 5 m (BBCH od 31 do 35) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 13% | 13% | 14% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 40% | 41% | 41% | 42% | 43% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 80% |

## Tabela numer 132 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 - Wydłużanie się pędów głównych ponad 5 m wysokości (BBCH od 36 do 39) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | 66% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 133 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 - Rozwój kwiatostanów (BBCH od 51 do 55) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

### Tabela numer 134 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 - Kwitnienie (BBCH od 61 do 69) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

### Tabela numer 135 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 - Rozwój szyszek (BBCH od 71 do 79) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

### Tabela numer 136 - Chmiel z 96 pędami

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 - Dojrzewanie szyszek (BBCH od 81 do 89) | | | | | | | | | Przyczyna | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 52% | 54% | 56% | 58% | 60% | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | 71% | 72% |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 86% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 98% | 100% |

## 19. Chrzan

### Tabela numer 1211 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1212 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 1213 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1214 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 1215 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-47, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

## Tabela numer 1216 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 48 - korzeń osiaga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 1217 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 5708 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5709 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 5710 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5711 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 5712 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-47, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5713 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 48 - korzeń osiaga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5714 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2341 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2342 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 2343 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2344 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 2345 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-47, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2346 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 48 - korzeń osiaga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2347 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 4388 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 4389 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 4390 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4391 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 4392 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-47, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

## Tabela numer 4393 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 48 - korzeń osiaga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 4394 - Chrzan

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 20. Cukinia

### Tabela numer 7918 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7919 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7920 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

### Tabela numer 7921 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

### Tabela numer 7925 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

### Tabela numer 7922 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7923 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

### Tabela numer 7924 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

### Tabela numer 7926 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

### Tabela numer 7927 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7928 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7929 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7930 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7931 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7932 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7933 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7934 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7935 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7936 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7937 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7938 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7939 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7940 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7941 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7942 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7943 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7944 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7945 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8002 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8003 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8004 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 8005 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 8009 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 8006 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8007 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 8008 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 8010 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 8011 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8012 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 8013 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8014 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 8015 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 8016 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8017 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 8018 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 8019 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 8020 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 8021 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8022 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 8023 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8024 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8025 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8026 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8027 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 8028 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 8029 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7946 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7947 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7948 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7949 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7953 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7950 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7951 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7952 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7954 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7955 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7956 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7957 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7958 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7959 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7960 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7961 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7962 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7963 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7964 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7965 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7966 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7967 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7968 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7969 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7970 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7971 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7972 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7973 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7974 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7975 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7976 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7977 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7981 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7978 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7979 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7980 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7982 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7983 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7984 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7985 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7986 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7987 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7988 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7989 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7990 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7991 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7992 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7993 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7994 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7995 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7996 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7997 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7998 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7999 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 8000 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

### Tabela numer 8001 - Cukinia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 21. Cykoria

### Tabela numer 2158 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2159 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2160 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

### Tabela numer 2161 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

### Tabela numer 2162 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

### Tabela numer 2163 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

### Tabela numer 2164 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2165 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2166 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6587 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6588 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6589 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 6590 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 6591 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 6592 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6593 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6594 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 6595 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3288 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3289 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3290 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 3291 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 3292 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 3293 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 3294 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3295 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 3296 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5335 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5336 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5337 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 5338 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 5339 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 5340 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5341 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5342 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

### Tabela numer 5343 - Cykoria

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 22. Czereśnia - konsumpcyjne

### Tabela numer 1218 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1219 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1220 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1221 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1222 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6756 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

### Tabela numer 2348 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2349 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2350 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2351 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2352 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4395 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4396 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 4397 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 4398 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4399 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5641 - Czereśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

## 23. Czosnek na spożycie

### Tabela numer 1223 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1224 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1226 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |

### Tabela numer 1227 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

### Tabela numer 1228 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

### Tabela numer 1230 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

### Tabela numer 1231 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

### Tabela numer 1232 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1234 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1235 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 5715 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5716 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5717 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5718 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 5719 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5720 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 5721 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 5722 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5723 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5724 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 2353 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2354 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2356 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |

## Tabela numer 2357 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2358 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2360 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2361 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2362 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2364 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2365 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 4400 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: kiełkowanie 09 - liścień wyrasta na powierzchnie gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4401 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4403 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |

## Tabela numer 4404 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4405 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4407 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4408 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

### Tabela numer 4409 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4411 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 4412 - Czosnek na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 17-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## 24. Dynia

### Tabela numer 7020 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7021 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7022 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

### Tabela numer 7023 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

### Tabela numer 7027 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7024 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7025 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7026 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7028 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7029 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7030 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7031 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7032 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7033 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7034 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7035 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7036 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7037 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7038 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7039 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7040 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7041 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7042 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7043 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7044 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7045 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7046 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7047 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7118 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7119 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7120 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7121 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7125 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7122 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7123 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7124 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7126 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7127 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7128 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7129 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7130 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7131 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7132 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7133 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7134 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7135 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7136 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7137 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7138 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7139 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7140 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7141 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7142 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7143 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7144 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7145 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7146 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7064 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7065 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7069 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7147 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7066 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7067 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7068 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7070 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7071 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7072 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7073 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7074 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7075 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7076 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7077 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7078 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7079 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7080 - Dynia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7081 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7082 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7083 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7084 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7085 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7086 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7087 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7088 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7089 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7090 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7091 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7092 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7093 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7097 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7094 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7095 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7096 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7098 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7099 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7100 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7101 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7102 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7103 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7104 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7105 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7106 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7107 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7108 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7109 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7110 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7111 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

### Tabela numer 7112 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

### Tabela numer 7113 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7114 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7115 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

### Tabela numer 7116 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

### Tabela numer 7117 - Dynia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 25. Facelia

### Tabela numer 8450 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |

### Tabela numer 8451 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8452 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8453 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8454 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8455 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |

## Tabela numer 8456 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 8457 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 8458 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8459 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

## Tabela numer 8460 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8461 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

## Tabela numer 8462 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8463 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8464 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8465 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8466 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8467 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 8468 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8470 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8471 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 8472 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8473 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8474 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8528 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |

## Tabela numer 8529 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8530 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8531 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8532 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8533 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |

## Tabela numer 8534 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 8535 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 8536 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8537 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

## Tabela numer 8538 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8539 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

## Tabela numer 8540 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8541 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8542 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8543 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8544 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8545 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 8546 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8548 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8549 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 8550 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8551 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8552 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8502 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |

## Tabela numer 8503 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8504 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8505 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8506 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8507 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |

## Tabela numer 8508 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 8509 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8510 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8511 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

## Tabela numer 8512 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8513 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

## Tabela numer 8514 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8515 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8516 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8517 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8518 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8519 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 8520 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8522 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8523 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 8524 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8525 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8526 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8476 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |

## Tabela numer 8477 - Facelia

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8478 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8479 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8480 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8481 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |

## Tabela numer 8482 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 8483 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 8484 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 8485 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

## Tabela numer 8486 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8487 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

## Tabela numer 8488 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8489 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8490 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8491 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 8492 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8493 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 8494 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój nasion / osadzanie nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8497 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 8498 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 8499 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 8500 - Facelia

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie nasion 80 - pierwsze dojrzałe nasiona, 89 - pełna dojrzałość, nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 26. Fasola

### Tabela numer 1236 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1237 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1238 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 1239 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 1240 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1241 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 1242 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 1243 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1244 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1245 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 1246 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 1247 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1248 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1249 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1250 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1251 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 1252 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1253 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1254 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 1255 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1256 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1257 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1258 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5725 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5726 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5727 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5728 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5729 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5730 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5731 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5732 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5733 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5734 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5735 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5736 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5737 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5738 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5739 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5740 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5741 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5742 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5743 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 5744 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5745 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5746 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5747 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2366 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2367 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2368 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 2369 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2370 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2371 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 2372 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 2373 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2374 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2375 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 2376 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 2377 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2378 - Fasola

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2379 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2380 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2381 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2382 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2383 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2384 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2385 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2386 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2387 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2388 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4413 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4414 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4415 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 4416 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 4417 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 4418 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 4419 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 4420 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4421 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 4422 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 4423 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 4424 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 4425 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4426 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4427 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4428 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 4429 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4430 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4431 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

### Tabela numer 4432 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4433 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 4434 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 4435 - Fasola

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 27. Groch

### Tabela numer 1259 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1260 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1261 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 1262 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 1263 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1264 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 1265 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 1266 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1267 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1268 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 1269 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1270 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1271 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1272 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1273 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1274 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 1275 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1276 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1277 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 1278 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1279 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1280 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1281 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5748 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5749 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5750 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5751 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5752 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5753 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5754 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5755 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5756 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5757 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5758 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5759 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5760 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5761 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5762 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5763 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5764 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5765 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5766 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 5767 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5768 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5769 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5770 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2389 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2390 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2391 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 2392 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2393 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2394 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 2395 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 2396 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2397 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2398 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2399 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 2400 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2401 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2402 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2403 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2404 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2405 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2406 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2407 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2408 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2409 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2410 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2411 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4436 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4437 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4438 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 4439 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 4440 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4441 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 4442 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 4443 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 4444 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 4445 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 4446 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 4447 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 4448 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4449 - Groch

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4450 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4451 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 4452 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 4453 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4454 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 4455 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4456 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 4457 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 4458 - Groch

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 28. Gruszka - konsumpcyjne

### Tabela numer 1282 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1283 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1284 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1285 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1286 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6770 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 90 |

### Tabela numer 2412 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2413 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 2414 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 2415 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2416 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4459 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 4460 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 4461 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 4462 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4463 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5655 - Gruszka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 90 |

## 29. Gryka

### Tabela numer 5535 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 61 | 73 | 86 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5538 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |

## Tabela numer 5539 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5540 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5541 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5542 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |

## Tabela numer 5543 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5544 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5545 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

## Tabela numer 5546 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 |

## Tabela numer 5547 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5548 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

## Tabela numer 5549 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 |

## Tabela numer 5550 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

## Tabela numer 5551 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |

## Tabela numer 5552 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5553 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 5554 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |

## Tabela numer 5555 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5556 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5557 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5558 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 5559 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | 86 |

## Tabela numer 5560 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5561 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5562 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5563 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5564 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 |

## Tabela numer 5565 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5566 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5567 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5568 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5569 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6719 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 61 | 73 | 86 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6720 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |

## Tabela numer 6721 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6722 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 6723 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6724 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |

## Tabela numer 6725 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 6726 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6727 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

## Tabela numer 6728 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 |

## Tabela numer 6729 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 6730 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

## Tabela numer 6731 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 |

## Tabela numer 6732 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

## Tabela numer 6733 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |

## Tabela numer 6734 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 6735 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 6736 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6737 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6738 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 |

## Tabela numer 6739 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6740 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 6741 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | 86 |

## Tabela numer 6742 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6743 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6744 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6745 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6746 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6747 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6748 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6749 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6750 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6751 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5570 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 61 | 73 | 86 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5571 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |

## Tabela numer 5572 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5573 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5574 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5575 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |

## Tabela numer 5576 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5577 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5578 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

## Tabela numer 5579 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 |

## Tabela numer 5580 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 5581 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

## Tabela numer 5582 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 |

## Tabela numer 5583 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

## Tabela numer 5584 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5585 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5586 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 5587 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |

## Tabela numer 5588 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5589 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5590 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5591 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 5592 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | 86 |

## Tabela numer 5593 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5594 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5595 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5596 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5597 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 |

## Tabela numer 5598 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5599 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5600 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5601 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5602 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5603 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 61 | 73 | 86 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5604 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5605 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5606 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5607 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2-3 wg skali BBCH, KOD: 20-39, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5608 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |

## Tabela numer 5609 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5610 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5611 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Dalszy wzrost pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

## Tabela numer 5612 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 77 | 82 |

## Tabela numer 5613 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 5614 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5615 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 |

## Tabela numer 5616 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-64, OPIS: Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |

## Tabela numer 5617 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |

## Tabela numer 5618 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 5619 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |

## Tabela numer 5620 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 76 |

## Tabela numer 5621 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70, OPIS: Początek osadzania | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5622 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 17 | 22 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5623 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5624 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5625 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | 86 |

## Tabela numer 5626 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71, OPIS: Połowa osadzania nasion | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5627 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5628 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5629 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5630 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 |

## Tabela numer 5631 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5632 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5633 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5634 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5635 - Gryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 30. Jabłko - konsumpcyjne

### Tabela numer 1287 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1288 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1289 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1290 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1291 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6757 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 90 |

### Tabela numer 2417 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2418 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2419 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2420 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2421 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4464 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4465 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 4466 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 4467 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4468 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5642 - Jabłko - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 90 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 31. Jabłko - przemysłowe

### Tabela numer 1292 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1293 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1294 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1295 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1296 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6769 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 90 |

### Tabela numer 2422 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2423 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 2424 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 2425 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2426 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4469 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 4470 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 4471 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 4472 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4473 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5654 - Jabłko - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 90 |

## 32. Jeżyna - konsumpcyjne

### Tabela numer 1297 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1298 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 1299 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 1300 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1301 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6763 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 80 | 80 |

## Tabela numer 2427 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2428 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2429 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2430 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2431 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4474 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 4475 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 4476 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 4477 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4478 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5648 - Jeżyna - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 80 | 80 |

## 33. Jęczmień jary - ziarno

### Tabela numer 1302 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1303 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

### Tabela numer 1304 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1305 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 1306 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 1307 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 1308 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 1309 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1310 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1311 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1312 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 1313 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1314 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1315 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1316 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 1317 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1318 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1319 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1320 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1321 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 1322 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1323 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5466 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1324 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1325 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

## Tabela numer 5469 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8729 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8730 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7582 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7583 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7584 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7585 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7586 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7587 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7588 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7589 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7590 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8034 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7591 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7592 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7593 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7594 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7595 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5771 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5772 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 5773 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 5774 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 5775 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 5776 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 5777 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 5778 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5779 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5780 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5781 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 5782 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 5783 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5784 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5785 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 5786 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 5787 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5788 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5789 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5790 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 5791 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5792 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6703 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5793 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5794 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

## Tabela numer 6704 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8735 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8736 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7624 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7625 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7626 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7627 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7628 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7629 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7630 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7631 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7632 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8037 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7633 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7634 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7635 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7636 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7637 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2432 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2433 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 2434 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 2435 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 2436 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2437 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 2438 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 2439 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2440 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2441 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 2442 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 2443 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2444 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2445 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2446 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2447 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 2448 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2449 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2450 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2451 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 2452 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 2453 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5467 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2454 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2455 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5470 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8731 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8732 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7596 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7597 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7598 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7599 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7600 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7601 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7602 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7603 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7604 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8035 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7605 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7606 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7607 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7608 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7609 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4479 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4480 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4481 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 4482 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 4483 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 4484 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 4485 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 4486 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4487 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4488 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 4489 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 4490 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4491 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4492 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4493 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 4494 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 4495 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4496 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4497 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4498 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 4499 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 4500 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5468 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4501 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4502 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

## Tabela numer 5471 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8733 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8734 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7610 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7611 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7612 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7613 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7614 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7615 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7616 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7617 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7618 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8036 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7619 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7620 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7621 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7622 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7623 - Jęczmień jary - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 34. Jęczmień ozimy - ziarno

### Tabela numer 1326 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1327 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

### Tabela numer 1328 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

### Tabela numer 1329 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

### Tabela numer 1330 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

### Tabela numer 1331 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

### Tabela numer 1332 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

### Tabela numer 1333 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1334 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1335 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1336 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 1337 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1338 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1339 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1340 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 1341 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1342 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1343 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1344 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1345 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 1346 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1347 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5457 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1348 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1349 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

## Tabela numer 5460 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8737 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8738 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7638 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7639 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7640 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7641 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7642 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7643 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7644 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7645 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7646 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8038 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7647 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7648 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7649 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7650 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7651 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5795 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5796 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 5797 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 5798 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5799 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 5800 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 5801 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 5802 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5803 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5804 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5805 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 5806 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 5807 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5808 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5809 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 5810 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 5811 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5812 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5813 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5814 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 5815 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5816 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6701 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5817 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5818 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

## Tabela numer 6702 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8743 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8744 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7680 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7681 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7682 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7683 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7684 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7685 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7686 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7687 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7688 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8041 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7689 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7690 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7691 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7692 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7693 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2456 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2457 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 2458 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 2459 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 2460 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 2461 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 2462 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 2463 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2464 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2465 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 2466 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2467 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2468 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2469 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2470 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 2471 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 2472 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2473 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2474 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2475 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 2476 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2477 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5458 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2478 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2479 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

## Tabela numer 5461 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8739 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8740 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7652 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7653 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7654 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7655 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7656 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7657 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7658 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7659 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7660 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8039 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7661 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7662 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7663 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7664 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7665 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4503 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4504 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 4505 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 4506 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 4507 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 4508 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 4509 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4510 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4511 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4512 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 4513 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 4514 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 4515 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4516 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4517 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 4518 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 4519 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4520 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4521 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4522 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## Tabela numer 4523 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 4524 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5459 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4525 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4526 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |

## Tabela numer 5462 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8741 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8742 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7666 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7667 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7668 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7669 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7670 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7671 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7672 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7673 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7674 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 8040 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7675 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7676 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

### Tabela numer 7677 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7678 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7679 - Jęczmień ozimy - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 35. Kabaczki

### Tabela numer 7372 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7373 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7374 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

### Tabela numer 7375 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7379 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

### Tabela numer 7376 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7377 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

### Tabela numer 7378 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

### Tabela numer 7380 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

### Tabela numer 7381 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7382 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

### Tabela numer 7383 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

### Tabela numer 7384 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 7385 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7386 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7387 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7388 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7389 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7390 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7391 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7392 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7393 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7394 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7395 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7396 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7397 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7398 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7399 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7456 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7457 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7458 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7459 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7463 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7460 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7461 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7462 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7464 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7465 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7466 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7467 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7468 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7469 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7470 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7471 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7472 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7473 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7474 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7475 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7476 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7477 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7478 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7479 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7480 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7481 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7482 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7483 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7400 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7401 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7402 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7403 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7407 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7404 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7405 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7406 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7408 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7409 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7410 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7411 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7412 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7413 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7414 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7415 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7416 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7417 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7418 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7419 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7420 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7421 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7422 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7423 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7424 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7425 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7426 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7427 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7428 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7429 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7430 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7431 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7435 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7432 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7433 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7434 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7436 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7437 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7438 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7439 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7440 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7441 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7442 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7443 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7444 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7445 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7446 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7447 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7448 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

### Tabela numer 7449 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

### Tabela numer 7450 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

### Tabela numer 7451 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7452 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7453 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

### Tabela numer 7454 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

### Tabela numer 7455 - Kabaczki

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 36. Kalafior na spożycie

### Tabela numer 1350 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1351 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

## Tabela numer 1352 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1353 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 1354 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 1355 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1356 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

## Tabela numer 1357 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1358 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1359 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1360 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5819 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

## Tabela numer 5820 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

## Tabela numer 5821 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5822 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 5823 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5824 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5825 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

## Tabela numer 5826 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5827 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5828 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 5829 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2480 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

## Tabela numer 2481 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

## Tabela numer 2482 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2483 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 2484 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 2485 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2486 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

## Tabela numer 2487 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2488 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2489 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 2490 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4527 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 95 |

## Tabela numer 4528 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 |

## Tabela numer 4529 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4530 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4531 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

### Tabela numer 4532 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

### Tabela numer 4533 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |

### Tabela numer 4534 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4535 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4536 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 4537 - Kalafior na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt, ciasno zamknięta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 37. Kalarepa na spożycie

### Tabela numer 1361 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1362 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 |

## Tabela numer 1363 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1364 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

## Tabela numer 1365 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |

## Tabela numer 1366 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1367 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1368 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |

## Tabela numer 1369 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1370 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5830 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 |

## Tabela numer 5831 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 |

## Tabela numer 5832 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5833 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

## Tabela numer 5834 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |

## Tabela numer 5835 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5836 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 5837 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |

## Tabela numer 5838 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5839 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2491 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 |

## Tabela numer 2492 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 |

## Tabela numer 2493 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2494 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2495 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |

## Tabela numer 2496 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2497 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2498 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2499 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2500 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4538 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 98 |

## Tabela numer 4539 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 |

## Tabela numer 4540 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4541 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |

## Tabela numer 4542 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - poczatek rozwoju główki; 43 - główka osiąga 30% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |

## Tabela numer 4543 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4544 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4545 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - główka osiąga 50% typowej wielkości; 48 - główka osiąga 80% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |

### Tabela numer 4546 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4547 - Kalarepa na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - główka osiagnęła typową wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |

## 38. Kapusta czerwona na spożycie

### Tabela numer 2220 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

### Tabela numer 6784 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

### Tabela numer 2221 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

### Tabela numer 6785 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

### Tabela numer 2222 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6786 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 2223 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6787 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6649 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 6650 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6651 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6652 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3350 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 6788 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3351 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6789 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 3352 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6790 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 3353 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6791 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5397 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 6792 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 5398 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 6793 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

### Tabela numer 5399 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 6794 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 5400 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

### Tabela numer 6795 - Kapusta czerwona na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## 39. Kapusta na spożycie

### Tabela numer 1371 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

### Tabela numer 6772 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

### Tabela numer 1372 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6773 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 1373 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6774 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 1374 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6775 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5840 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 5841 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 5842 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 5843 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2501 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 6776 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 2502 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6777 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 2503 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6778 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 2504 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6779 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 4548 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 6780 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

### Tabela numer 4549 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

### Tabela numer 6781 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

### Tabela numer 4550 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 6782 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 4551 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

### Tabela numer 6783 - Kapusta na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## 40. Kapusta pekińska

### Tabela numer 8685 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8701 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 8686 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8702 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8687 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8703 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8688 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8704 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8697 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 8698 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8699 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8700 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8689 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 8705 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 8690 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8706 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8691 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8707 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8692 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8708 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8693 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 8709 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 8694 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8710 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-42, OPIS: Rozwój główek 41 - zaczynają się tworzyć główki; 42 - główka osiaga 20% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 8695 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8711 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 43-47, OPIS: Rozwój główek 43 - główka osiąga 30%typowej wielkości; 47 - główka osiaga 70% typowej wielkości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8696 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 8712 - Kapusta pekińska

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Rozwój główek 48 - główka osiąga 80%typowej wielkości; 49 - główki osiągaja typowa wielkość i kształt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 41. Konopie

### Tabela numer 8554 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 8555 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 8556 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

### Tabela numer 8557 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

### Tabela numer 8558 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 |

### Tabela numer 8559 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

### Tabela numer 8560 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

### Tabela numer 8561 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8562 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8563 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

## Tabela numer 8564 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8565 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

## Tabela numer 8566 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8567 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8578 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8579 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8580 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8581 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8582 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 8583 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8584 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8585 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8586 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8568 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8569 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |

## Tabela numer 8570 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8571 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 |

## Tabela numer 8572 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8573 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8574 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8575 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |

## Tabela numer 8576 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8577 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8653 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8654 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8655 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8656 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 8657 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 |

## Tabela numer 8658 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

## Tabela numer 8659 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 8660 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

## Tabela numer 8661 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8662 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

## Tabela numer 8663 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8664 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8665 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8666 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8677 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8678 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8679 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |

## Tabela numer 8680 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8681 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 8682 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8683 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8684 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8667 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8668 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |

## Tabela numer 8669 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8670 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 |

## Tabela numer 8671 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8672 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8673 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8674 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |

## Tabela numer 8675 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8676 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8587 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8588 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8589 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

## Tabela numer 8590 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 8591 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 |

## Tabela numer 8592 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

## Tabela numer 8593 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 8594 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8595 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8596 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

## Tabela numer 8597 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8598 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

## Tabela numer 8599 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8600 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8611 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8612 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8613 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8614 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8615 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 8616 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8617 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8618 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8619 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8601 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8602 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |

## Tabela numer 8603 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8604 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 |

## Tabela numer 8605 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8606 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8607 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8608 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |

## Tabela numer 8609 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8610 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8620 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8621 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 8622 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8623 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 8624 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 |

## Tabela numer 8625 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

## Tabela numer 8626 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 8627 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 57 | 64 | 71 | 79 | 86 |

## Tabela numer 8628 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8629 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

## Tabela numer 8630 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8631 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 93 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8632 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8633 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8644 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8645 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8646 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |

## Tabela numer 8647 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8648 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 8649 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8650 - Konopie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8651 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8652 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8634 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8635 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 |

## Tabela numer 8636 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 8637 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 56 | 60 | 62 | 64 |

## Tabela numer 8638 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8639 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8640 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8641 - Konopie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 8642 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

### Tabela numer 8643 - Konopie

| Faza rozwoju | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## 42. Koper na zielono

### Tabela numer 1375 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

### Tabela numer 1376 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

### Tabela numer 1377 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 56 | 100 |

### Tabela numer 1378 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

### Tabela numer 1379 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

### Tabela numer 1380 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 |

### Tabela numer 1381 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1382 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5844 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 5845 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 5846 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 56 | 100 |

## Tabela numer 5847 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

## Tabela numer 5848 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

## Tabela numer 5849 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 |

## Tabela numer 5850 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5851 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |

## Tabela numer 2505 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 2506 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2507 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 56 | 100 |

## Tabela numer 2508 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

## Tabela numer 2509 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

## Tabela numer 2510 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 |

## Tabela numer 2511 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2512 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |

## Tabela numer 4552 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 4553 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa kiełkowanie/rozwój liści, KOD: 09-10, OPIS: Rozwój liści od fazy liścieni do 1 liścia właściwego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 4554 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 56 | 100 |

## Tabela numer 4555 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 12-15, OPIS: Rozwój liści od fazy 2 do 5 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4556 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |

### Tabela numer 4557 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 16-18, OPIS: Rozwój liści od fazy 6 do 8 liści właściwych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 39 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 |

### Tabela numer 4558 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4559 - Koper na zielono

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa rozwój liści, KOD: 19+, OPIS: Rozwój liści od fazy 9 lisci lub więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 |

## 43. Kukurydza cukrowa

### Tabela numer 1383 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1384 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1385 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

### Tabela numer 1386 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1387 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1388 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

## Tabela numer 1389 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1390 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

## Tabela numer 1391 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 1392 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 1393 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1394 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1395 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 1396 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1397 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1398 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1399 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 1400 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5852 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5853 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5854 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 5855 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5856 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5857 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

## Tabela numer 5858 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5859 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

## Tabela numer 5860 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 5861 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5862 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5863 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5864 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 5865 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5866 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5867 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5868 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 5869 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2513 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2514 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2515 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 2516 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2517 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2518 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

## Tabela numer 2519 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2520 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

## Tabela numer 2521 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 2522 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 2523 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2524 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2525 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 2526 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2527 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2528 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2529 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 2530 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4560 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4561 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4562 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 4563 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4564 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4565 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

## Tabela numer 4566 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4567 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

## Tabela numer 4568 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 4569 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 4570 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 4571 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4572 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 4573 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4574 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4575 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4576 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

### Tabela numer 4577 - Kukurydza cukrowa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 44. Kukurydza kiszonka

### Tabela numer 2224 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2225 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |

### Tabela numer 2226 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

### Tabela numer 2227 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2228 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2229 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 2230 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 2231 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 6653 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6654 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6655 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 6656 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6657 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6658 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 6659 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 6660 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 3354 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3355 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 3356 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 3357 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 3358 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3359 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3360 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 3361 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5401 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5402 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 5403 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 5404 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia, znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5405 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5406 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 5407 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5408 - Kukurydza kiszonka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## 45. Kukurydza na ziarno

### Tabela numer 1401 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1402 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1403 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

### Tabela numer 1404 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1405 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

### Tabela numer 1406 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

### Tabela numer 1407 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 1408 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1409 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 1410 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 1411 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1412 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1413 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 1414 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

## Tabela numer 1415 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1416 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1417 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1418 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5870 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5871 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5872 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 5873 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5874 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

## Tabela numer 5875 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

## Tabela numer 5876 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5877 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5878 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 5879 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5880 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5881 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5882 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 5883 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

## Tabela numer 5884 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5885 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5886 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5887 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2531 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2532 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2533 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 2534 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2535 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

## Tabela numer 2536 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

## Tabela numer 2537 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2538 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2539 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 2540 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 2541 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2542 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2543 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 2544 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

## Tabela numer 2545 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2546 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2547 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2548 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4578 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-11, OPIS: Rozwój lisci 10 - z koleoptyla powstaje pierwszy liść; 11 - faza 1 liścia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4579 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 57 | 69 | 81 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4580 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 12-19, OPIS: Rozwój liści 12 - faza 2 liścia; 19 - faza 9 lub więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 4581 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 68 | 79 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4582 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 |

## Tabela numer 4583 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 | 34 |

## Tabela numer 4584 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4585 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4586 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 4587 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 4588 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 4589 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4590 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 4591 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |

## Tabela numer 4592 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4593 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4594 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4595 - Kukurydza na ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm; 89 - dojrzałość pełna, ziarniaki twarde i błyszczące około 65% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 46. Kukurydza na zieloną masę

### Tabela numer 6896 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH: KOD: 00–09, OPIS: Kiełkowanie Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 60 | 70 | 80 | 100 |

### Tabela numer 6820 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 80 | 100 |

### Tabela numer 6821 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 6822 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 6823 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 6836 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 70 | 85 | 100 |

### Tabela numer 6837 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6838 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6839 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6864 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6865 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6866 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6867 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1419 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1420 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1421 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1422 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1423 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1424 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1425 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 1426 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6880 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6881 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6882 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 6883 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6899 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH: KOD: 00–09, OPIS: Kiełkowanie Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 60 | 70 | 80 | 100 |

## Tabela numer 6832 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 80 | 100 |

## Tabela numer 6833 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6834 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6835 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6860 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 70 | 85 | 100 |

## Tabela numer 6861 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6862 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6863 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6876 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6877 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6878 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6879 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5888 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5889 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5890 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 5891 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5892 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5893 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5894 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 5895 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6892 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6893 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6894 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 6895 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6897 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH: KOD: 00–09, OPIS: Kiełkowanie Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 60 | 70 | 80 | 100 |

## Tabela numer 6824 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 80 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6825 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6826 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6827 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6852 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 70 | 85 | 100 |

## Tabela numer 6853 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6854 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6855 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6868 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6869 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6870 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6871 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2549 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2550 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2551 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 2552 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2553 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2554 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2555 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2556 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6884 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6885 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6886 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 6887 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6898 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH: KOD: 00–09, OPIS: Kiełkowanie Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 60 | 70 | 80 | 100 |

## Tabela numer 6828 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 80 | 100 |

## Tabela numer 6829 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6830 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6831 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH: KOD: 10–15, OPIS: Listnienie ( faza 1-5 liści) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6856 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 70 | 85 | 100 |

## Tabela numer 6857 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6858 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6859 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 16–19 i 3 (30), OPIS: Początek formowania źdźbeł ( faza 6 – 9 lub więcej liści ) Szkoda w plonie zielonej masy kukurydzy wskutek uszkodzenia roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6872 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6873 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6874 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6875 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój źdźbła (wydłużanie pędu) 30 - początek wzrostu źdźbła; 39 - faza 9 lub wiecej kolanek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4596 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4597 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4598 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 4599 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój wiechy, kłoszenie 51 - poczatek ukazania się wiechy; 69 - koniec fazy kwitnienia; znamiona i szyjki słupków suche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4600 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4601 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 4602 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 4603 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój ziarniaków 71 - rozwój pierwszych ziarniaków o konsystencji wodnistej; 73 - poczatek dojrzałości mlecznej; 79 - ziarniaki osiagają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6888 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 6889 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 6890 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

### Tabela numer 6891 - Kukurydza na zieloną masę

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie 83 - początek dojrzałości woskowej około 45% sm | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 47. Len

### Tabela numer 8319 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 42 | 52 | 66 | 82 | 100 |

### Tabela numer 8320 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

### Tabela numer 8321 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

### Tabela numer 8322 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 |

### Tabela numer 8323 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

### Tabela numer 8324 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 31 | 37 | 44 | 52 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8325 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8326 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 14 |

## Tabela numer 8327 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8328 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

## Tabela numer 8329 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 8330 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 8331 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

## Tabela numer 8332 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8333 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8334 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8335 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## Tabela numer 8336 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

## Tabela numer 8337 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8338 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8339 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8340 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 8341 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8342 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8343 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8344 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8345 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 8346 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8347 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8348 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8349 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8350 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8351 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8418 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 42 | 52 | 66 | 82 | 100 |

## Tabela numer 8419 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

## Tabela numer 8420 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

## Tabela numer 8421 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 |

## Tabela numer 8422 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 8423 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 31 | 37 | 44 | 52 |

## Tabela numer 8424 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8425 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 14 |

## Tabela numer 8426 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8427 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

## Tabela numer 8428 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 8429 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 8430 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

## Tabela numer 8431 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8432 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

## Tabela numer 8433 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8434 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## Tabela numer 8435 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8436 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8437 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8438 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8439 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 8440 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8441 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 8442 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8443 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8444 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8445 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8446 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8447 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8448 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8449 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8352 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 42 | 52 | 66 | 82 | 100 |

## Tabela numer 8353 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 42 | 52 | 66 | 82 | 100 |

## Tabela numer 8354 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

## Tabela numer 8355 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8356 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 8357 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 31 | 37 | 44 | 52 |

## Tabela numer 8358 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 |

## Tabela numer 8359 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 14 |

## Tabela numer 8360 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8361 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

## Tabela numer 8362 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |

## Tabela numer 8363 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 8364 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8365 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8366 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

## Tabela numer 8367 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 8368 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## Tabela numer 8369 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

## Tabela numer 8370 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8371 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8372 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8373 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8374 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8375 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 8376 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8377 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8378 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 8379 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8380 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8381 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8382 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8383 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8384 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8385 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 42 | 52 | 66 | 82 | 100 |

## Tabela numer 8386 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

## Tabela numer 8387 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 34 | 42 |

## Tabela numer 8388 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 |

## Tabela numer 8389 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 8390 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 31 | 37 | 44 | 52 |

## Tabela numer 8391 - Len

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8392 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 14 |

## Tabela numer 8393 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8394 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

## Tabela numer 8395 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 8396 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 8397 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 58 | 66 | 75 |

## Tabela numer 8398 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8399 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

## Tabela numer 8400 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8401 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## Tabela numer 8402 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 13 | 17 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 | 68 | 77 | 87 |

## Tabela numer 8403 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8404 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8405 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8406 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 8407 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 63 | 70 | 78 | 87 | 100 |

## Tabela numer 8408 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 8409 - Len

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8410 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8411 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 8412 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 8413 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8414 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8415 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8416 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 8417 - Len

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 48. Lędźwian

### Tabela numer 2065 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 2066 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 2067 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 2068 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 2069 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Tabela numer 2070 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

### Tabela numer 2071 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

### Tabela numer 2072 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2073 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2074 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 2075 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 2076 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2077 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2078 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2079 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2080 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2081 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2082 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2083 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2084 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2085 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2086 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2087 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6494 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6495 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6496 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6497 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6498 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6499 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 6500 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 6501 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6502 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6503 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 6504 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 6505 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6506 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6507 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6508 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6509 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6510 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6511 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6512 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6513 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6514 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6515 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6516 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3195 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3196 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3197 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 3198 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 3199 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3200 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 3201 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3202 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3203 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3204 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 3205 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 3206 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3207 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 3208 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3209 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3210 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3211 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3212 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3213 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 3214 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3215 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3216 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3217 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5242 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5243 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5244 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5245 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5246 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5247 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5248 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5249 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5250 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5251 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5252 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5253 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5254 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5255 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5256 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5257 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5258 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5259 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5260 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 5261 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5262 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 5263 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 5264 - Lędźwian

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 49. Łubin

### Tabela numer 1973 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1974 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1975 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 1976 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 1977 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1978 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 1979 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 1980 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1981 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1982 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 1983 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 1984 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1985 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1986 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1987 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1988 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 1989 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1990 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1991 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 1992 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1993 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1994 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1995 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6402 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6403 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6404 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 6405 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6406 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6407 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 6408 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 6409 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6410 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6411 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 6412 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 6413 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6414 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6415 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6416 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6417 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6418 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6419 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6420 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6421 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6422 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6423 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6424 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3103 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3104 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3105 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 3106 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3107 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3108 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 3109 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 3110 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3111 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3112 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 3113 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 3114 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3115 - Łubin

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3116 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3117 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3118 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 3119 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3120 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3121 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 3122 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3123 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3124 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3125 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5150 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5151 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5152 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5153 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5154 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5155 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5156 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5157 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5158 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5159 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5160 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5161 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5162 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5163 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5164 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5165 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5166 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5167 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5168 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

### Tabela numer 5169 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5170 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 5171 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 5172 - Łubin

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 50. Mak

### Tabela numer 1427 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 52 | 60 | 70 | 85 | 100 |

### Tabela numer 1428 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1429 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1430 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

## Tabela numer 1431 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |

## Tabela numer 1432 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |

## Tabela numer 1433 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1434 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |

## Tabela numer 1435 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |

## Tabela numer 1436 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 47 | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 88 |

## Tabela numer 1437 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 1438 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 |

## Tabela numer 1439 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1440 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 |

## Tabela numer 1441 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 1442 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |

## Tabela numer 1443 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

## Tabela numer 1444 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1445 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 |

## Tabela numer 1446 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 |

## Tabela numer 1447 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 1448 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1449 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1450 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |

## Tabela numer 1451 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## Tabela numer 1452 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1453 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1454 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 1455 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 22 |

## Tabela numer 1456 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5896 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 52 | 60 | 70 | 85 | 100 |

## Tabela numer 5897 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5898 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5899 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

## Tabela numer 5900 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |

## Tabela numer 5901 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |

## Tabela numer 5902 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 5903 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |

## Tabela numer 5904 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5905 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 47 | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 88 |

## Tabela numer 5906 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 5907 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 |

## Tabela numer 5908 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5909 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 |

## Tabela numer 5910 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5911 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |

## Tabela numer 5912 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

## Tabela numer 5913 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5914 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 |

## Tabela numer 5915 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 |

## Tabela numer 5916 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 5917 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5918 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5919 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |

## Tabela numer 5920 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## Tabela numer 5921 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5922 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5923 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 5924 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 22 |

## Tabela numer 5925 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2557 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 52 | 60 | 70 | 85 | 100 |

## Tabela numer 2558 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2559 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2560 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

## Tabela numer 2561 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |

## Tabela numer 2562 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |

## Tabela numer 2563 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2564 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |

## Tabela numer 2565 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |

## Tabela numer 2566 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 47 | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 88 |

## Tabela numer 2567 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2568 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 |

## Tabela numer 2569 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2570 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 |

## Tabela numer 2571 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 2572 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |

## Tabela numer 2573 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

## Tabela numer 2574 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2575 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 |

## Tabela numer 2576 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 |

## Tabela numer 2577 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 2578 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2579 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2580 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |

## Tabela numer 2581 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |

## Tabela numer 2582 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2583 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2584 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 2585 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 22 |

## Tabela numer 2586 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4604 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 52 | 60 | 70 | 85 | 100 |

## Tabela numer 4605 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4606 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4607 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

## Tabela numer 4608 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Formowanie pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |

## Tabela numer 4609 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 |

## Tabela numer 4610 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 4611 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |

## Tabela numer 4612 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój pędów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |

## Tabela numer 4613 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 47 | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 88 |

## Tabela numer 4614 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 4615 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 |

## Tabela numer 4616 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych Początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4617 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 |

## Tabela numer 4618 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 4619 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |

## Tabela numer 4620 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie Pełnia kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

## Tabela numer 4621 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4622 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 |

## Tabela numer 4623 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 |

## Tabela numer 4624 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców Formowanie makówek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 4625 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4626 - Mak

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4627 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |

### Tabela numer 4628 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |

### Tabela numer 4629 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4630 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

### Tabela numer 4631 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

### Tabela numer 4632 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Woskowa dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 22 |

### Tabela numer 4633 - Mak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 51. Malina - konsumpcyjne

### Tabela numer 1457 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1458 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1459 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1460 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1461 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6753 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 80 | 80 |

## Tabela numer 2587 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2588 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2589 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2590 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2591 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4634 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4635 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4636 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 4637 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4638 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5638 - Malina - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 80 | 80 |

## 52. Marchew pastewna

### Tabela numer 2149 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2150 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2151 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

### Tabela numer 2152 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

### Tabela numer 2153 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2154 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2155 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2156 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2157 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6578 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6579 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6580 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 6581 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 6582 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6583 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6584 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6585 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 6586 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3279 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3280 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3281 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 3282 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 3283 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3284 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 3285 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3286 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 3287 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5326 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5327 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5328 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

## Tabela numer 5329 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 5330 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5331 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

### Tabela numer 5332 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5333 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

### Tabela numer 5334 - Marchew pastewna

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 53. Marchew spożywcza

### Tabela numer 1462 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

### Tabela numer 1463 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

### Tabela numer 1464 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 1465 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1466 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1467 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 1468 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5926 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 5927 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

## Tabela numer 5928 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5929 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 5930 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5931 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5932 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2592 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 2593 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

## Tabela numer 2594 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2595 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 2596 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2597 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 2598 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4639 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4640 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

### Tabela numer 4641 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 4642 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

### Tabela numer 4643 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

### Tabela numer 4644 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

### Tabela numer 4645 - Marchew spożywcza

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 54. Melon

### Tabela numer 7260 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7261 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7262 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7263 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7267 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7264 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7265 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7266 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7268 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7269 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7270 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7271 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7272 - Melon

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7273 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7274 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7275 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7276 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7277 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7278 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7279 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7280 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7281 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7282 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7283 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7284 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7285 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7286 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7287 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7344 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7345 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7346 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7347 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7351 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7348 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7349 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7350 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7352 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7353 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7354 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7355 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7356 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7357 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7358 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7359 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7360 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7361 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7362 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7363 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7364 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7365 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7366 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7367 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7368 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7369 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7370 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 7371 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7288 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7289 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7290 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7291 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7295 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7292 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7293 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7294 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7296 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 7297 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7298 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7299 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7300 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7301 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7302 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7303 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7304 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7305 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7306 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

## Tabela numer 7307 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7308 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

## Tabela numer 7309 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 7310 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 7311 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7312 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7313 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

## Tabela numer 7314 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7315 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7316 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Wschody | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7317 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7318 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 7319 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 7323 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Formowanie pędu głównego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 7320 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7321 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |

## Tabela numer 7322 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 |

## Tabela numer 7324 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29: OPIS: Formowanie pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7325 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7326 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |

## Tabela numer 7327 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 |

## Tabela numer 7328 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7329 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Początek kwitnienia żeńskich kwiatów | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 7330 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7331 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 7332 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |

## Tabela numer 7333 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 7334 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie - początek zawiązywania owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | 62 | 66 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7335 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7336 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 |

### Tabela numer 7337 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 |

### Tabela numer 7338 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |

### Tabela numer 7339 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców - owoce do ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7340 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7341 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |

### Tabela numer 7342 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |

### Tabela numer 7343 - Melon

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-88, OPIS: Dojrzewanie owoców i nasion - owoce ponad ½ wielkości handlowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 55. Morela - konsumpcyjne

### Tabela numer 1469 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1470 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 1471 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 1472 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1473 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6765 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 |

## Tabela numer 2599 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2600 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2601 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2602 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2603 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4646 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 4647 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 4648 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 4649 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4650 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5650 - Morela - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 |

## 56. Nektarynka

### Tabela numer 6764 - Nektarynka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 |

### Tabela numer 5649 - Nektarynka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 |

## 57. Ogórek

### Tabela numer 1474 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1475 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 41 | 50 |

## Tabela numer 1476 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1477 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 |

## Tabela numer 1478 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 55 |

## Tabela numer 1479 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 1480 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 1481 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 |

## Tabela numer 1482 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 52 | 60 |

## Tabela numer 1483 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1484 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |

## Tabela numer 1485 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 1486 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 |

## Tabela numer 1487 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 |

## Tabela numer 1488 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 1489 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 |

## Tabela numer 1490 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 5933 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |

## Tabela numer 5934 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 41 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5935 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5936 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 |

## Tabela numer 5937 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 55 |

## Tabela numer 5938 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 5939 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 5940 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 |

## Tabela numer 5941 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 52 | 60 |

## Tabela numer 5942 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

## Tabela numer 5943 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5944 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 5945 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 |

## Tabela numer 5946 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 |

## Tabela numer 5947 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 5948 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 |

## Tabela numer 5949 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 2604 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |

## Tabela numer 2605 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 41 | 50 |

## Tabela numer 2606 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2607 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 |

## Tabela numer 2608 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 55 |

## Tabela numer 2609 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2610 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 2611 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 |

## Tabela numer 2612 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 52 | 60 |

## Tabela numer 2613 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

## Tabela numer 2614 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |

## Tabela numer 2615 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2616 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 |

## Tabela numer 2617 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 |

## Tabela numer 2618 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 2619 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 |

## Tabela numer 2620 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 4651 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |

## Tabela numer 4652 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 41 | 50 |

## Tabela numer 4653 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4654 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4655 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 27 | 55 |

## Tabela numer 4656 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 4657 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pierwszorzędowy pęd; 29 - widocznych 9 i wiecej pędów 1-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 4658 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 |

## Tabela numer 4659 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 52 | 60 |

## Tabela numer 4660 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

## Tabela numer 4661 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |

## Tabela numer 4662 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: 5 - Rozwój kwiatostanu 51 - zawiązek 1-go pąka na pędzie głównym; 6 - Kwitnienie 69 - na pędzie głównym otwarty 9 kwiat i kolejne | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 4663 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4664 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 |

### Tabela numer 4665 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

### Tabela numer 4666 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 |

### Tabela numer 4667 - Ogórek

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość do zbioru; 79 - dziewięć i więcej owoców osiąga wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## 58. Orzech - konsumpcyjne

### Tabela numer 1491 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1492 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1493 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1494 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1495 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6754 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 |

## Tabela numer 2621 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2622 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2623 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2624 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2625 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4668 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4669 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 4670 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 4671 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4672 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5639 - Orzech - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 80 | 80 | 80 |

## 59. Owies - ziarno

### Tabela numer 1496 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1497 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

### Tabela numer 1498 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

### Tabela numer 1499 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

### Tabela numer 1500 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

### Tabela numer 1501 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

### Tabela numer 1502 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1503 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1504 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1505 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1506 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 1507 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1508 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1509 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1510 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 1511 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1512 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1513 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1514 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1515 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |

## Tabela numer 1516 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1517 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5475 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1518 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1519 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |

## Tabela numer 5478 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8745 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8746 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7694 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7695 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7696 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7697 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7698 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7699 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7700 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7701 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7702 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8030 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7703 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7704 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7705 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7706 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7707 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5950 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5951 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 5952 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5953 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 5954 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 5955 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 5956 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 5957 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5958 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5959 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5960 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 5961 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 5962 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5963 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5964 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 5965 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 5966 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5967 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5968 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5969 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |

## Tabela numer 5970 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5971 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6705 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5972 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5973 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |

## Tabela numer 6706 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8751 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8752 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7736 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7737 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7738 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7739 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7740 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7741 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7742 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7743 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7744 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8033 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7745 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7746 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7747 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7748 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7749 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2626 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2627 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 2628 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 2629 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 2630 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 2631 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 2632 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 2633 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2634 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2635 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 2636 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 2637 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2638 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2639 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2640 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 2641 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 2642 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2643 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2644 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2645 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |

## Tabela numer 2646 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 2647 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5476 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2648 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2649 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |

## Tabela numer 5479 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8747 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8748 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7708 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7709 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7710 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7711 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7712 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7713 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7714 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7715 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7716 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8031 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7717 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7718 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7719 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7720 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7721 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4673 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4674 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 4675 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 4676 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 4677 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4678 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 4679 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 4680 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4681 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4682 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 4683 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 4684 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 4685 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4686 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4687 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4688 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 4689 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4690 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4691 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4692 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 |

## Tabela numer 4693 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 4694 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5477 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4695 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4696 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5480 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8749 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8750 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7722 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7723 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7724 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7725 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7726 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7727 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7728 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7729 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

### Tabela numer 7730 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 8032 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7731 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7732 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

### Tabela numer 7733 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7734 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7735 - Owies - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 60. Papryka

### Tabela numer 1520 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 50 | 59 | 69 | 79 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1521 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1522 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |

## Tabela numer 1523 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |

## Tabela numer 1524 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1525 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 54 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1526 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |

## Tabela numer 1527 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 1528 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1529 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1530 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 1531 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 1532 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1533 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1534 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1535 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 1536 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 1537 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1538 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1539 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1540 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5974 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 50 | 59 | 69 | 79 | 90 | 100 |

## Tabela numer 5975 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5976 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |

## Tabela numer 5977 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |

## Tabela numer 5978 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5979 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 54 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5980 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5981 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 5982 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5983 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5984 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 5985 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 5986 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5987 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5988 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5989 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5990 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 5991 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5992 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5993 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5994 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2650 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 50 | 59 | 69 | 79 | 90 | 100 |

## Tabela numer 2651 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2652 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |

## Tabela numer 2653 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2654 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2655 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 54 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2656 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |

## Tabela numer 2657 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 2658 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2659 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2660 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 2661 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 2662 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2663 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2664 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2665 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 2666 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 2667 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2668 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 2669 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2670 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4697 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści na pędzie głównym | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 44 | 50 | 59 | 69 | 79 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4698 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4699 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |

## Tabela numer 4700 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |

## Tabela numer 4701 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 4702 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 54 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4703 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 |

## Tabela numer 4704 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 4705 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Dalszy rozwój pędów bocznych widoczne 9 i wiecej pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 4706 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4707 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 4708 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 |

## Tabela numer 4709 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | 58 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4710 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy pąk kwiatowy; 69 - otwarty 9-ty kwiat | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4711 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4712 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 4713 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 4714 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4715 - Papryka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwszy owoc osiągnął typowa wielkość i kształt; 79 - dziewiąty owoc osiągnął typową wielkość i formę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4716 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4717 - Papryka

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Dojrzewanie 89 - pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 61. Pasternak

### Tabela numer 2232 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

### Tabela numer 2233 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

### Tabela numer 2234 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 2235 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

### Tabela numer 2236 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

### Tabela numer 2237 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

### Tabela numer 2238 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6661 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 6662 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

## Tabela numer 6663 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6664 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 6665 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6666 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6667 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3362 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 3363 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3364 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 3365 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 3366 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 3367 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 3368 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5409 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 5410 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

## Tabela numer 5411 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5412 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5413 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

### Tabela numer 5414 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

### Tabela numer 5415 - Pasternak

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 62. Peluszka

### Tabela numer 2088 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 2089 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 2090 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 2091 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 2092 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2093 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 2094 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 2095 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2096 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2097 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 2098 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 2099 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2100 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2101 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2102 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2103 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2104 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2105 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2106 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2107 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2108 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2109 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2110 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6517 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6518 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6519 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 6520 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6521 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6522 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 6523 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 6524 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6525 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6526 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 6527 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 6528 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6529 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6530 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6531 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6532 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6533 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6534 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6535 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6536 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6537 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6538 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6539 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3218 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3219 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3220 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 3221 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3222 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3223 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 3224 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 3225 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3226 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3227 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 3228 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 3229 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3230 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3231 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3232 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3233 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 3234 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3235 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3236 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 3237 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3238 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3239 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3240 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5265 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5266 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5267 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5268 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5269 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5270 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5271 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5272 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5273 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5274 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5275 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5276 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5277 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5278 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5279 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5280 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5281 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5282 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5283 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

### Tabela numer 5284 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5285 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 5286 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 5287 - Peluszka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 63. Pietruszka na spożycie

### Tabela numer 1541 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

### Tabela numer 1542 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1543 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 1544 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 1545 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1546 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 1547 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5995 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 5996 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

## Tabela numer 5997 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 5998 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5999 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6000 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6001 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2671 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 2672 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

## Tabela numer 2673 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2674 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 2675 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2676 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2677 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4718 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 78 | 88 | 100 |

## Tabela numer 4719 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 |

## Tabela numer 4720 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 4721 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 4722 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4723 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 4724 - Pietruszka na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 64. Pomidor

### Tabela numer 1548 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1549 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

### Tabela numer 1550 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |

### Tabela numer 1551 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

### Tabela numer 1552 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1553 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

### Tabela numer 1554 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

### Tabela numer 1555 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1556 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 1557 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1558 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |

## Tabela numer 1559 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 |

## Tabela numer 1560 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 |

## Tabela numer 1561 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 95 |

## Tabela numer 1562 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1563 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 67 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 |

## Tabela numer 1564 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1565 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 1566 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 64 | 70 |

## Tabela numer 1567 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1568 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1569 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 1570 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 1571 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 1572 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |

## Tabela numer 1573 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1574 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1575 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 1576 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 1577 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1578 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |

## Tabela numer 1579 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6002 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6003 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 6004 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6005 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 6006 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6007 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

## Tabela numer 6008 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 6009 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |

## Tabela numer 6010 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6011 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6012 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |

## Tabela numer 6013 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6014 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 |

## Tabela numer 6015 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 95 |

## Tabela numer 6016 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6017 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 67 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 |

## Tabela numer 6018 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 6019 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6020 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 64 | 70 |

## Tabela numer 6021 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6022 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6023 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiągnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 6024 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiągnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 6025 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiągnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6026 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiągnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |

## Tabela numer 6027 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiągnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 |

## Tabela numer 6028 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiągnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6029 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6030 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 6031 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6032 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6033 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2678 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2679 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2680 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |

## Tabela numer 2681 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 2682 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2683 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

## Tabela numer 2684 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2685 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |

## Tabela numer 2686 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 2687 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2688 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |

## Tabela numer 2689 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 |

## Tabela numer 2690 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 |

## Tabela numer 2691 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 95 |

## Tabela numer 2692 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2693 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 67 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2694 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2695 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2696 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 64 | 70 |

## Tabela numer 2697 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2698 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2699 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 2700 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 2701 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2702 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2703 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 |

## Tabela numer 2704 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2705 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 2706 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 2707 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2708 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2709 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4725 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4726 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4727 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |

## Tabela numer 4728 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny 1-szy pęd boczny I-go rzędu; 29 - widocznych 9 pędów bocznych I-go rzędu | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

## Tabela numer 4729 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4730 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

## Tabela numer 4731 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 4732 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |

## Tabela numer 4733 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu/kwitnienie 51 - widoczny 1-szy kwiatostan; 69 - dziewięć lub większa liczba kwiatostanów z otwartymi kwiatami | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 4734 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4735 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4736 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 |

## Tabela numer 4737 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 |

## Tabela numer 4738 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 | 95 |

## Tabela numer 4739 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 71 - pierwsze grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4740 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 67 | 72 | 76 | 81 | 85 | 90 |

## Tabela numer 4741 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |

## Tabela numer 4742 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 4743 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 61 | 64 | 70 |

## Tabela numer 4744 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 70 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4745 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 72 - drugie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 4746 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 4747 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

## Tabela numer 4748 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 4749 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |

## Tabela numer 4750 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 60 |

## Tabela numer 4751 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój owoców 73 - trzecie grono owoców 1-szy owoc osiagnął typowa wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4752 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 4753 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4754 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

### Tabela numer 4755 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |

### Tabela numer 4756 - Pomidor

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 88-89, OPIS: Dojrzewanie owoców powyżej 80% owoców uzyskuje typowa barwę | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

## 65. Por na spożycie

### Tabela numer 1580 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

### Tabela numer 1581 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

### Tabela numer 1582 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 8119 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1583 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1584 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1585 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 8120 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1586 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1587 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1588 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8121 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1589 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 1590 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 1591 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8122 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6034 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6035 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6036 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8131 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6037 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6038 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 6039 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 8132 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6040 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6041 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6042 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8133 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6043 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6044 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 6045 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8134 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2710 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2711 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 2712 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 8123 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2713 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2714 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 2715 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 8124 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2716 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2717 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2718 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8125 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2719 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2720 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 2721 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 8126 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4757 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 4758 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 4759 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8127 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4760 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4761 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 4762 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## Tabela numer 8128 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4763 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4764 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4765 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8129 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4766 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

### Tabela numer 4767 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

### Tabela numer 4768 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

### Tabela numer 8130 - Por na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 66. Porzeczka - konsumpcyjne

### Tabela numer 1592 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1593 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1594 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1595 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1596 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6760 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## Tabela numer 2722 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2723 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2724 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2725 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2726 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4769 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4770 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 4771 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 4772 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4773 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5645 - Porzeczka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## 67. Poziomka

### Tabela numer 6960 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

### Tabela numer 6961 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

### Tabela numer 6962 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

### Tabela numer 6963 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

### Tabela numer 6964 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |

### Tabela numer 6965 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

### Tabela numer 6966 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 80 | 90 | 100 |

### Tabela numer 6967 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6968 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |

## Tabela numer 6969 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 6970 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6971 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 82 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6972 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6973 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6974 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6975 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 80 | 83 | 88 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6976 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 6977 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6978 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6979 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6762 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## Tabela numer 6980 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6981 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6982 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6983 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |

## Tabela numer 6984 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

## Tabela numer 6985 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6986 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 80 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6987 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6988 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |

## Tabela numer 6989 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 6990 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6991 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 82 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6992 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6993 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6994 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6995 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 80 | 83 | 88 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6996 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6997 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6998 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6999 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7000 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 7001 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 7002 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 7003 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |

## Tabela numer 7004 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

## Tabela numer 7005 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 7006 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 80 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7007 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 7008 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |

## Tabela numer 7009 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 7010 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 7011 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 82 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 7012 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 7013 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7014 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 7015 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 80 | 83 | 88 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7016 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7017 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7018 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7019 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5647 - Poziomka

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## 68. Pszenica jara - ziarno

### Tabela numer 1597 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1598 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

### Tabela numer 1599 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

### Tabela numer 1600 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

### Tabela numer 1601 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1602 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 1603 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 1604 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1605 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1606 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1607 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 1608 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1609 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1610 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1611 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1612 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1613 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1614 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1615 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1616 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 1617 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1618 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5484 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1619 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1620 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5487 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8721 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8722 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7526 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7527 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7528 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7529 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7530 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7531 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7532 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7533 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7534 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8042 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7535 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7536 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7537 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7538 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7539 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6046 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6047 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6048 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 6049 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 6050 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 6051 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 6052 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 6053 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6054 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6055 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 6056 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 6057 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6058 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6059 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6060 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 6061 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 6062 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6063 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6064 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6065 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 6066 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6067 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6707 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6068 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6069 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6708 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8727 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8728 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7568 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7569 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7570 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7571 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7572 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7573 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7574 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7575 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7576 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8045 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7577 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7578 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7579 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7580 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7581 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2727 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2728 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 2729 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 2730 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 2731 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 2732 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 2733 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 2734 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2735 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2736 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 2737 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 2738 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2739 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2740 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2741 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 2742 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 2743 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2744 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2745 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2746 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 2747 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 2748 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5485 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2749 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2750 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5488 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8723 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8724 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7540 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7541 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7542 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7543 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7544 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7545 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7546 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7547 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7548 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8043 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7549 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7550 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7551 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7552 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7553 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4774 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4775 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 4776 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 4777 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4778 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 4779 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 4780 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 4781 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4782 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4783 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 4784 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 4785 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 4786 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4787 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4788 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 4789 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 4790 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4791 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4792 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4793 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 4794 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 4795 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5486 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4796 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4797 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5489 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8725 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8726 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7554 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7555 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7556 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7557 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7558 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7559 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7560 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7561 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7562 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8044 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7563 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7564 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7565 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7566 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7567 - Pszenica jara - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 69. Pszenica ozima - ziarno

### Tabela numer 1621 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1622 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

### Tabela numer 1623 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

### Tabela numer 1624 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

### Tabela numer 1625 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

### Tabela numer 1626 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

### Tabela numer 1627 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

### Tabela numer 1628 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 1629 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1630 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1631 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 1632 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1633 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1634 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1635 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 1636 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1637 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1638 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1639 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1640 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 1641 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1642 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5493 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1643 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1644 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5496 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8713 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8714 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7050 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7051 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7052 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7053 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7054 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7055 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7056 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7057 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7058 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8062 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7059 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7060 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7061 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7062 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7063 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6070 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6071 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 6072 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 6073 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 6074 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6075 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 6076 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 6077 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6078 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6079 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 6080 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 6081 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 6082 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6083 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6084 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6085 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 6086 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6087 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6088 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6089 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 6090 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6091 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6709 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6092 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6093 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6710 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8719 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8720 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7512 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7513 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7514 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7515 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7516 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7517 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7518 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7519 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7520 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 7521 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7522 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7523 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7524 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7525 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2751 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2752 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 2753 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2754 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 2755 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 2756 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 2757 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 2758 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2759 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2760 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 2761 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 2762 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2763 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2764 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2765 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 2766 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 2767 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2768 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2769 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2770 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 2771 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 2772 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5494 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2773 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2774 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5497 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8715 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8716 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7484 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7485 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7486 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7487 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7488 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7489 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7490 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7491 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7492 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 7493 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7494 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7495 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7496 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7497 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4798 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4799 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 4800 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 4801 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 4802 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 4803 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 4804 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 4805 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4806 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4807 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 4808 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4809 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 4810 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4811 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4812 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 4813 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 4814 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4815 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4816 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4817 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 4818 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4819 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5495 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4820 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4821 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5498 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8717 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8718 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7498 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7499 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7500 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7501 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7502 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7503 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7504 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7505 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7506 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 7507 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7508 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7509 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7510 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7511 - Pszenica ozima - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 70. Pszenżyto - ziarno

### Tabela numer 1645 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1646 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

### Tabela numer 1647 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

### Tabela numer 1648 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

### Tabela numer 1649 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

### Tabela numer 1650 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

### Tabela numer 1651 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

### Tabela numer 1652 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1653 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1654 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1655 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 1656 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1657 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1658 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1659 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 1660 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1661 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1662 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1663 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1664 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 1665 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1666 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5502 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1667 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1668 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5505 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8777 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8778 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8063 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8064 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 8065 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8066 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8067 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8046 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8068 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8069 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 8070 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8071 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8072 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8073 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 8074 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8075 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8076 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6094 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6095 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 6096 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 6097 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6098 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 6099 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 6100 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 6101 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6102 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6103 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 6104 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 6105 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 6106 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6107 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6108 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 6109 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 6110 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6111 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6112 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6113 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 6114 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6115 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6711 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6116 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6117 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6712 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8783 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8784 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8105 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8106 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 8107 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8108 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8109 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8049 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8110 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8111 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 8112 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8113 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8114 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8115 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 8116 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8117 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8118 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2775 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2776 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 2777 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 2778 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 2779 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 2780 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 2781 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 2782 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2783 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2784 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 2785 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2786 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 2787 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2788 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2789 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 2790 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 2791 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2792 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2793 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2794 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 2795 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2796 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5503 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2797 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2798 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5506 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8779 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8780 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8077 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8078 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 8079 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8080 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8081 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8047 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8082 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8083 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 8084 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 8085 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8086 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8087 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 8088 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8089 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8090 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4822 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4823 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 4824 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 4825 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 4826 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 4827 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 4828 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4829 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4830 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4831 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 4832 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 4833 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 4834 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4835 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4836 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 4837 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 4838 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4839 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 4840 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4841 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Tabela numer 4842 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 4843 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5504 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4844 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4845 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5507 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8781 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8782 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8091 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8092 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 8093 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 8094 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8095 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 8048 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8096 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8097 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 8098 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 8099 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 8100 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 8101 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

### Tabela numer 8102 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 8103 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 8104 - Pszenżyto - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 71. Rzepa

### Tabela numer 2176 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2177 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2178 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2179 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 2180 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 2181 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2182 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2183 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 2184 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6605 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6606 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6607 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6608 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 6609 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 6610 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6611 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6612 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 6613 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3306 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3307 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3308 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3309 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

## Tabela numer 3310 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

## Tabela numer 3311 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 3312 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3313 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

## Tabela numer 3314 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5353 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Kiełkowanie 00 kłębki/nasiona suche, burak 19 - kiełek przedostaje się na powierzchnię gleby; pozostałe 09 - liścienie przebijają się | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5354 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5355 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie ułożone horyzontalnie, widoczny pierwszy liść; 19 - faza 9 liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5356 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 89 | 96 | 102 | 108 | 115 |

### Tabela numer 5357 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 36 |

### Tabela numer 5358 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-39, OPIS: Rozwój rozety (zakrywanie miedzyrzędzi) 32 - zakryte 20% pow. gleby; 39 - całkowite zakrycie miedzyrzędzi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |

### Tabela numer 5359 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 3 | 6 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5360 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |

### Tabela numer 5361 - Rzepa

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 40-49, OPIS: Wzrost korzeni (organów wegetatywnych roślin przeznaczonych do zbioru) 49 - korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 72. Rzepak jary

### Tabela numer 1669 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

### Tabela numer 1670 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1671 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 1672 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 1673 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 1674 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 1675 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 1676 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 1677 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1678 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 1679 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1680 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 1681 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 1682 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1683 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 1684 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 1685 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 1686 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 1687 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1688 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1689 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1690 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 1691 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 1692 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1693 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 1694 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 1695 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1696 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1697 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1698 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1699 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 1700 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 1701 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6118 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6119 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6120 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6121 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 6122 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6123 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6124 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 6125 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 6126 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6127 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 6128 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6129 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 6130 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 6131 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6132 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 6133 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 6134 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 6135 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 6136 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6137 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6138 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6139 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 6140 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6141 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6142 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 6143 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6144 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6145 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6146 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6147 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6148 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6149 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6150 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2799 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2800 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2801 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2802 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 2803 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2804 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2805 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 2806 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2807 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2808 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 2809 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 2810 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 2811 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 2812 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2813 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 2814 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 2815 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2816 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 2817 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2818 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2819 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2820 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 2821 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 2822 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2823 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 2824 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2825 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2826 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2827 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2828 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2829 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2830 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2831 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4846 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 4847 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4848 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 4849 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 4850 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 4851 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 4852 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 4853 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 4854 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4855 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 4856 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4857 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 4858 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 4859 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4860 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 4861 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 4862 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 4863 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 4864 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4865 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4866 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4867 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 4868 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 4869 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4870 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 4871 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 4872 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 4873 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4874 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4875 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4876 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 4877 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 4878 - Rzepak jary

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 73. Rzepak ozimy

### Tabela numer 2239 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

### Tabela numer 2240 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2241 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

### Tabela numer 2242 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2243 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2244 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2245 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 2246 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 2247 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2248 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 2249 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 2250 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 2251 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2252 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2253 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 2254 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 2255 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 2256 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 2257 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2258 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2259 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2260 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2261 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 2262 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2263 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 2264 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2265 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2266 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2267 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2268 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2269 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2270 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2271 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6668 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6669 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6670 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6671 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 6672 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6673 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6674 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6675 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 6676 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6677 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 6678 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6679 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 6680 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 6681 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6682 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 6683 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6684 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 6685 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 6686 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6687 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6688 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6689 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 6690 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 6691 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6692 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6693 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6694 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6695 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6696 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6697 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6698 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6699 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6700 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3369 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3370 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3371 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 3372 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 3373 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 3374 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 3375 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 3376 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 3377 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3378 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3379 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 3380 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 3381 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 3382 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3383 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 3384 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 3385 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 3386 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 3387 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3388 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3389 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3390 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 3391 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 3392 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3393 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 3394 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 3395 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3396 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3397 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3398 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3399 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 3400 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 3401 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5416 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 5417 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5418 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 5419 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5420 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 5421 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 5422 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 5423 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 5424 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5425 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 5426 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 5427 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 5428 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5429 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5430 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 5431 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 5432 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 5433 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 5434 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5435 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5436 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5437 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5438 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 5439 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5440 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 5441 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 5442 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5443 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 5444 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5445 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5446 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5447 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 5448 - Rzepak ozimy

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 74. Rzepik

### Tabela numer 1702 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

### Tabela numer 1703 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1704 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

### Tabela numer 1705 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

### Tabela numer 1706 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

### Tabela numer 1707 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1708 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 1709 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 1710 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1711 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 1712 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 1713 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 1714 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 1715 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1716 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1717 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 1718 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 1719 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 1720 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1721 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 1722 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1723 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 1724 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 1725 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1726 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 1727 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 1728 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 1729 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1730 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1731 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1732 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 1733 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 1734 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6151 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6152 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6153 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6154 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 6155 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6156 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6157 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 6158 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 6159 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Oczętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6160 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 6161 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6162 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 6163 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 6164 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6165 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 6166 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 6167 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 6168 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6169 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6170 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6171 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6172 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 6173 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 6174 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6175 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 6176 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6177 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6178 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6179 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6180 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6181 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6182 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6183 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2832 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2833 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2834 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2835 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 2836 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2837 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2838 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 2839 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 2840 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2841 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 2842 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 2843 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2844 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 2845 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2846 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 2847 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 2848 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 2849 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 2850 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2851 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2852 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągneło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2853 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 2854 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 2855 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2856 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 2857 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2858 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2859 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2860 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2861 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2862 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2863 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2864 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4879 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 4880 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 4881 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 40 | 48 | 60 | 75 | 90 | 98 | 100 |

## Tabela numer 4882 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 |

## Tabela numer 4883 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 20 - brak pędów, 29 - koniec formowania pędów, widocznych 9 lub wiecej pędów bocznych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 4884 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 | 39 | 47 | 55 | 67 | 81 | 95 | 98 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4885 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 |

## Tabela numer 4886 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 38 |

## Tabela numer 4887 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Wzrost (wydłużanie) pędu głównego 30 - początek wydłużania pędu (brak międzywęźli), 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4888 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

## Tabela numer 4889 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |

## Tabela numer 4890 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 |

## Tabela numer 4891 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 4892 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 50-59, OPIS: Rozwój paków kwiatowych 50 - pąki kwiatowe zamkniete w lisciach, 59 -żółty pąk | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4893 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4894 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## Tabela numer 4895 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 35 |

## Tabela numer 4896 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 57 | 68 | 83 |

## Tabela numer 4897 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-69, OPIS: Kwitnienie 60 - otwarte pierwsze kwiaty, 69 - koniec fazy kwitnienia, wszystkie płatki opadły | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4898 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 73 | 78 | 89 | 100 |

## Tabela numer 4899 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4900 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |

## Tabela numer 4901 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 56 | 59 | 64 | 69 | 77 | 87 | 98 |

## Tabela numer 4902 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój owoców 71 -10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, 79 - prawie wszystkie łuszczyny osiagnęły typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4903 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 96 | 100 |

## Tabela numer 4904 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 4905 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 4906 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4907 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-87, OPIS: Dojrzewanie 80 - poczatek dojrzewania (nasiona zielone), 87 -70 procent łuszczyn dojrzewa nasiona brązowe i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 4908 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4909 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 4910 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 4911 - Rzepik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość prawie wszystkie łuszczyna dojrzałe, nasiona brązowo-czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoc - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 75. Rzodkiew

### Tabela numer 1735 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 1736 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

### Tabela numer 1737 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1738 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

### Tabela numer 1739 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

### Tabela numer 1740 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

### Tabela numer 6184 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 6185 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6186 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6187 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 6188 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6189 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2865 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2866 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 2867 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2868 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 2869 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 2870 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

### Tabela numer 4912 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 4913 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

### Tabela numer 4914 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4915 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

### Tabela numer 4916 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

### Tabela numer 4917 - Rzodkiew

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## 76. Rzodkiewka

### Tabela numer 1741 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1742 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 1743 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1744 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 1745 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

## Tabela numer 1746 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6190 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6191 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 6192 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6193 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6194 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6195 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2871 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2872 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

## Tabela numer 2873 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2874 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

## Tabela numer 2875 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2876 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 4918 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4919 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 |

### Tabela numer 4920 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4921 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 |

### Tabela numer 4922 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - korzeń osiąga 50% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 |

### Tabela numer 4923 - Rzodkiewka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## 77. Sałata na spożycie

### Tabela numer 1747 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1748 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

### Tabela numer 1749 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1750 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 1751 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1752 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |

## Tabela numer 1753 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1754 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 |

## Tabela numer 6196 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6197 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6198 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6199 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6200 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6201 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |

## Tabela numer 6202 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6203 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 |

## Tabela numer 2877 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2878 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2879 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2880 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 2881 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2882 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |

## Tabela numer 2883 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2884 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 |

## Tabela numer 4924 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4925 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 4926 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 61 | 66 | 71 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 4927 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - osiągnięci 10% masy liściowej; 43 - osiagnięcie 30% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |

## Tabela numer 4928 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4929 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 45-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 45 - osiągnięcie 50% masy liściowej; 80 - osiagnięcie 80% masy liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 | 45 | 50 | 53 | 57 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4930 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4931 - Sałata na spożycie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - osiągnięta typowa masa liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 55 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 | 83 | 88 | 93 |

## 78. Seler naciowy

### Tabela numer 1762 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 1763 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

### Tabela numer 1764 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1765 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 |

### Tabela numer 1766 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

### Tabela numer 6808 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1767 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 6809 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 1768 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6810 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6211 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6212 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 6213 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6214 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 |

## Tabela numer 6215 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6817 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

## Tabela numer 6216 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 6818 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 6217 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6819 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2892 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2893 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 2894 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2895 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2896 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

## Tabela numer 6811 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

## Tabela numer 2897 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 6812 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 2898 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6813 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 4939 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 4940 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - faza wyprostowanego liścienia; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |

## Tabela numer 4941 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4942 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-13, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 53 |

### Tabela numer 4943 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

### Tabela numer 6814 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |

### Tabela numer 4944 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

### Tabela numer 6815 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

### Tabela numer 4945 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

### Tabela numer 6816 - Seler naciowy

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Zbiór | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## 79. Seler na korzenie

### Tabela numer 1755 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

### Tabela numer 1756 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1757 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1758 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |

## Tabela numer 1759 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 6796 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 1760 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6797 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 1761 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6798 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6204 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6205 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 6206 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6207 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |

## Tabela numer 6208 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 6805 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 6209 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6806 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6210 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6807 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2885 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2886 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 2887 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2888 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |

## Tabela numer 2889 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 6799 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 2890 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6800 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 2891 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6801 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## Tabela numer 4932 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 4933 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści 10 - liścienie całkowicie rozwinięte, widoczny punkt wzrostu 1-liścia; 19 - faza 9 i więcej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 4934 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4935 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-43, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 41 - korzenie zaczynają się poszerzać; 43 - korzeń osiąga 30% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |

## Tabela numer 4936 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 6802 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 44-46, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 44 - korzeń osiąga 40% typowej średnicy; 46 - korzeń osiąga 60% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 4937 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6803 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 47-48, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 47 - korzeń osiąga 70% typowej średnicy; 48 - korzeń osiąga 80% typowej średnicy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4938 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

### Tabela numer 6804 - Seler na korzenie

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 49, OPIS: Rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru 49 - całkowity rozwój, korzeń osiaga typową wielkość do zbioru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

## 80. Słonecznik

### Tabela numer 1769 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 93 | 100 |

### Tabela numer 1770 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1771 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

### Tabela numer 1772 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

### Tabela numer 1773 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Tabela numer 1774 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1775 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 |

## Tabela numer 1776 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |

## Tabela numer 1777 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1778 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1779 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 1780 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 1781 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1782 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 1783 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1784 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 |

## Tabela numer 1785 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 24 |

## Tabela numer 1786 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 1787 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 1788 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1789 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1790 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 1791 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1792 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8786 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6218 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6219 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6220 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6221 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

## Tabela numer 6222 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6223 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6224 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 |

## Tabela numer 6225 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6226 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6227 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6228 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 6229 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 6230 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6231 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 6232 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6233 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 |

## Tabela numer 6234 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 24 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6235 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6236 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6237 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6238 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6239 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6240 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6241 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8788 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 2899 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 93 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2900 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2901 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2902 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

## Tabela numer 2903 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 2904 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2905 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 |

## Tabela numer 2906 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |

## Tabela numer 2907 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2908 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2909 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 2910 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

## Tabela numer 2911 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2912 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 2913 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2914 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 |

## Tabela numer 2915 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 24 |

## Tabela numer 2916 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2917 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2918 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2919 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2920 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2921 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2922 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8785 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 4946 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - liścienie calkowicie rozwinięte, 19 - dziewięć lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 80 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4947 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4948 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4949 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów bocznych | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 |

## Tabela numer 4950 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 30-39, OPIS: Rozwój (wzrost) pędu 30 - początek wydłuzania pędu; 39 - widoczne 9 lub więcej międzywęźli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 4951 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 4952 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 |

## Tabela numer 4953 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 |

## Tabela numer 4954 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Rozwój kwiatostanu 51 - widoczny kwiatostan pomiędzy najmłodszymi liśćmi; 59 - kwiatostan ciągle zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 4955 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4956 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |

## Tabela numer 4957 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 4958 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4959 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie 61 - początek kwitnienia, widoczne kwiaty 1/3 kwiatostanu; 69 - koniec fazy kwitnienia, kwiaty zasychają i opadają | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 65 | 80 |

## Tabela numer 4960 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4961 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 |

## Tabela numer 4962 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 24 |

## Tabela numer 4963 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 77 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4964 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-79, OPIS: Rozwój niełupek (owoców) 71 - niełupki zewnętrzne szare, osiagają typowa wielkość; 79 - niełupki wewnętrzne szare, osiągają typową wielkość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 4965 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 4966 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 4967 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 4968 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie 80 - początek dojrzewania niełupki zewnętrzne czarne i twarde; 89 - pełna dojrzałość, niełupki wewnetrznej części owocostanu czarne i twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 4969 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 8787 - Słonecznik

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 9 wg skali BBCH, KOD: 92-99, OPIS: Zamieranie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 81. Soczewica

### Tabela numer 2042 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 2043 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 2044 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

### Tabela numer 2045 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 2046 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2047 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 2048 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 2049 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2050 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2051 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 2052 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 2053 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2054 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2055 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2056 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2057 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2058 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2059 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2060 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2061 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2062 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2063 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2064 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6471 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6472 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6473 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 6474 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6475 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6476 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 6477 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 6478 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6479 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6480 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 6481 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 6482 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6483 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6484 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6485 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6486 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6487 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6488 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6489 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oćętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6490 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6491 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6492 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6493 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3172 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3173 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3174 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 3175 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3176 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3177 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 3178 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 3179 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3180 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3181 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 3182 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 3183 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3184 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3185 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3186 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3187 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 3188 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3189 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3190 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 3191 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3192 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3193 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3194 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5219 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5220 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5221 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5222 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5223 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5224 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5225 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5226 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5227 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5228 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5229 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5230 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5231 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5232 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5233 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5234 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5235 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5236 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5237 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

### Tabela numer 5238 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5239 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

### Tabela numer 5240 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

### Tabela numer 5241 - Soczewica

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 82. Soja

### Tabela numer 1996 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

### Tabela numer 1997 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1998 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 1999 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2000 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2001 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 2002 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 2003 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2004 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2005 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 2006 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2007 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2008 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2009 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2010 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2011 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2012 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2013 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2014 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2015 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2016 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2017 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2018 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6425 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6426 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6427 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 6428 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6429 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6430 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6431 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 6432 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6433 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6434 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 6435 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 6436 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6437 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6438 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6439 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6440 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6441 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6442 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6443 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6444 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6445 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6446 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6447 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3126 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3127 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3128 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 3129 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 3130 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3131 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 3132 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 3133 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3134 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3135 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3136 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 3137 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3138 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 3139 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3140 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3141 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 3142 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3143 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3144 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3145 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3146 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3147 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3148 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5173 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5174 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5175 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5176 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 5177 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5178 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5179 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5180 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5181 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5182 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5183 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5184 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5185 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5186 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5187 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5188 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5189 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5190 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5191 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 5192 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5193 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5194 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5195 - Soja

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 83. Szczypiorek na liście (z nasion)

### Tabela numer 1816 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 83 | 91 | 100 |

### Tabela numer 1817 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |

### Tabela numer 1818 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

### Tabela numer 1819 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

### Tabela numer 1820 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1821 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |

### Tabela numer 1822 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

### Tabela numer 1823 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1824 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 1825 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 |

## Tabela numer 1826 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

## Tabela numer 1827 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 1828 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 1829 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 1830 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 6265 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 83 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6266 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6267 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 6268 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6269 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6270 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |

## Tabela numer 6271 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Tabela numer 6272 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6273 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6274 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 |

## Tabela numer 6275 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6276 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 6277 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 6278 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6279 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 2946 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 83 | 91 | 100 |

## Tabela numer 2947 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 2948 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 2949 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 2950 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2951 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |

## Tabela numer 2952 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Tabela numer 2953 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2954 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

## Tabela numer 2955 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 |

## Tabela numer 2956 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2957 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## Tabela numer 2958 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 |

## Tabela numer 2959 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2960 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## Tabela numer 4993 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 | 60 | 67 | 75 | 83 | 91 | 100 |

## Tabela numer 4994 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 |

## Tabela numer 4995 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |

## Tabela numer 4996 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 01wg skali BBCH, KOD: 11-13, OPIS: Rozwój liści 11 - wyraźnie widoczny 1 liść; 13 - wyraźnie widoczny 3 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 4997 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |

## Tabela numer 4998 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |

## Tabela numer 4999 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Tabela numer 5000 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-16, OPIS: Rozwój liści 14 - wyraźnie widoczny (>3cm) 4 liść; 16 - wyraźnie widoczny (>3cm) 6 liść | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5001 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 93 | 100 |

### Tabela numer 5002 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 |

### Tabela numer 5003 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

### Tabela numer 5004 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 14-19, OPIS: Rozwój liści 17 - wyraźnie widoczny (>3cm) 7 liść; 19-wyraźnie widoczny 9 liść | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

### Tabela numer 5005 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 |

### Tabela numer 5006 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |

### Tabela numer 5007 - Szczypiorek na liście (z nasion)

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 19, OPIS: Rozwój liści 19-wyraźnie widoczny 9 liść i więcej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

## 84. Śliwa - konsumpcyjne

### Tabela numer 1831 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1832 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1833 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 1834 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1835 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6767 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

## Tabela numer 2961 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2962 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2963 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2964 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2965 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5008 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5009 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 5010 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 5011 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5012 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5652 - Śliwa - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

## 85. Śliwa - przemysłowe

### Tabela numer 1836 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1837 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1838 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1839 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1840 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6768 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

## Tabela numer 2966 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2967 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 2968 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2969 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2970 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5013 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5014 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 5015 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5016 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5017 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5653 - Śliwa - przemysłowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

## 86. Truskawka - konsumpcyjne

### Tabela numer 6900 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

### Tabela numer 6901 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

### Tabela numer 6902 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

### Tabela numer 6903 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

### Tabela numer 6904 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |

### Tabela numer 6905 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6906 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 80 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6907 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6908 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |

## Tabela numer 6909 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 6910 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6911 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 82 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6912 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6913 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6914 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6915 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 80 | 83 | 88 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6916 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 6917 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6918 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6919 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6761 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## Tabela numer 6920 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6921 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6922 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6923 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |

## Tabela numer 6924 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6925 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6926 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 80 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6927 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6928 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |

## Tabela numer 6929 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 6930 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6931 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 82 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6932 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6933 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6934 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6935 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 80 | 83 | 88 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6936 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

## Tabela numer 6937 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6938 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6939 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6940 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57 | 65 | 74 | 83 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6941 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6942 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 41-49 Rozwój pędów rozłogowych i młodych roślin | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6943 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |

## Tabela numer 6944 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6945 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 33 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |

## Tabela numer 6946 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 55-59 Rozwój kwiatostanu, początek kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 80 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6947 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 25 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6948 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |

## Tabela numer 6949 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |

## Tabela numer 6950 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6 wg skali BBCH, KOD: 60-67 Kwitnienie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 | 91 | 100 |

## Tabela numer 6951 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 57 | 62 | 69 | 72 | 75 | 82 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6952 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |

## Tabela numer 6953 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6954 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72 Rozwój owoców, osadzanie owoców | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 6955 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 59 | 63 | 70 | 73 | 80 | 83 | 88 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6956 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |

### Tabela numer 6957 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 81-85 dojrzewanie owoców, pierwsze owoce dojrzałe zbiór wczesny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6958 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 60 | 64 | 70 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6959 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 87-89 pełna dojrzałość większość owoców wybarwiona zbór główny i późny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5646 - Truskawka - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

## 87. Tytoń ciemny

### Tabela numer 10 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

### Tabela numer 11 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 12 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.3% | 2% | 2.6% | 3.3% | 3.9% | 4.6% | 5.2% | 5.9% | 6.5% | 13% | 19.5% | 26% | 32.5% | 39% | 45.5% | 52% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 13 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.9% | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 4.4% | 5.3% | 6.2% | 7% | 7.9% | 8.8% | 17.5% | 26.3% | 35% | 43.8% | 52.5% | 61.3% | 70% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 14 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.7% | 4% | 5.3% | 6.7% | 8% | 9.3% | 10.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 15 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 7.1% | 10.7% | 14.2% | 17.8% | 21.3% | 24.9% | 28.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 16 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.6% | 17.3% | 23.1% | 28.9% | 34.7% | 40.4% | 46.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 17 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 5.5% | 6.2% | 7% | 7.8% | 15.6% | 23.3% | 31.1% | 38.9% | 46.7% | 54.4% | 62.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 18 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 4.8% | 6% | 7.2% | 8.4% | 9.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 19 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.4% | 9.6% | 12.8% | 16% | 19.2% | 22.4% | 25.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.8% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 20 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.6% | 4.2% | 4.7% | 5.2% | 10.4% | 15.6% | 20.8% | 26% | 31.2% | 36.4% | 41.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 46.8% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 21 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 63% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 22 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.1% | 2.2% | 3.3% | 4.4% | 5.5% | 6.5% | 7.6% | 8.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9.8% | 10.9% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 23 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 11.6% | 14.5% | 17.5% | 20.4% | 23.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26.2% | 29.1% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 24 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.4% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.5% | 14.2% | 18.9% | 23.6% | 28.4% | 33.1% | 37.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42.5% | 47.3% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 25 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 5.1% | 5.8% | 6.4% | 12.7% | 19.1% | 25.5% | 31.8% | 38.2% | 44.5% | 50.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 57.3% | 63.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 26 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9% | 10% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 27 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.3% | 8% | 10.7% | 13.3% | 16% | 18.7% | 21.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24% | 26.7% | 29.3% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 28 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 8.7% | 13% | 17.3% | 21.7% | 26% | 30.3% | 34.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39% | 43.3% | 47.7% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 29 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.7% | 17.5% | 23.3% | 29.2% | 35% | 40.8% | 46.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52.5% | 58.3% | 64.2% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 30 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.8% | 2.8% | 3.7% | 4.6% | 5.5% | 6.5% | 7.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 8.3% | 9.2% | 10.2% | 11.1% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 31 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 4.9% | 7.4% | 9.8% | 12.3% | 14.8% | 17.2% | 19.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.2% | 24.6% | 27.1% | 29.5% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 32 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 33 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.2% | 3.8% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 21.5% | 26.9% | 32.3% | 37.7% | 43.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48.5% | 53.8% | 59.2% | 64.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 34 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.7% | 2.6% | 3.4% | 4.3% | 5.1% | 6% | 6.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7.7% | 8.6% | 9.4% | 10.3% | 11.1% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 35 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.1% | 11.4% | 13.7% | 16% | 18.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.6% | 22.9% | 25.1% | 27.4% | 29.7% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 36 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.9% | 18.6% | 22.3% | 26% | 29.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.4% | 37.1% | 40.9% | 44.6% | 48.3% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 37 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 38 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7.2% | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 39 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 4.3% | 6.4% | 8.5% | 10.7% | 12.8% | 14.9% | 17.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19.2% | 21.3% | 23.5% | 25.6% | 27.7% | 29.9% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 40 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 6.9% | 10.4% | 13.9% | 17.3% | 20.8% | 24.3% | 27.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.2% | 34.7% | 38.1% | 41.6% | 45.1% | 48.5% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 41 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.3% | 14% | 18.7% | 23.3% | 28% | 32.7% | 37.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42% | 46.7% | 51.3% | 56% | 60.7% | 65.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 42 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 2.3% | 3% | 3.8% | 4.5% | 5.3% | 6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9% | 9.8% | 10.5% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 43 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 44 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.6% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.5% | 9.8% | 13% | 16.3% | 19.5% | 22.8% | 26% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29.3% | 32.5% | 35.8% | 39% | 42.3% | 45.5% | 48.8% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 45 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.4% | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 30.6% | 35% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39.4% | 43.8% | 48.1% | 52.5% | 56.9% | 61.3% | 65.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 50 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.4% | 7.1% | 7.8% | 8.5% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 51 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 13.2% | 15.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16.9% | 18.8% | 20.7% | 22.6% | 24.5% | 26.4% | 28.2% | 30.1% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 52 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 6.1% | 9.2% | 12.2% | 15.3% | 18.4% | 21.4% | 24.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27.5% | 30.6% | 33.6% | 36.7% | 39.8% | 42.8% | 45.9% | 48.9% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 53 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | 4.1% | 8.2% | 12.4% | 16.5% | 20.6% | 24.7% | 28.8% | 32.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 37.1% | 41.2% | 45.3% | 49.4% | 53.5% | 57.6% | 61.8% | 65.9% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 46 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.3% | 2% | 2.7% | 3.3% | 4% | 4.7% | 5.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6% | 6.7% | 7.3% | 8% | 8.7% | 9.3% | 10% | 10.7% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 47 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.6% | 5.3% | 7.1% | 8.9% | 10.7% | 12.4% | 14.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16% | 17.8% | 19.6% | 21.3% | 23.1% | 24.9% | 26.7% | 28.4% | 30.2% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 48 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 11.6% | 14.4% | 17.3% | 20.2% | 23.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26% | 28.9% | 31.8% | 34.7% | 37.6% | 40.4% | 43.3% | 46.2% | 49.1% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 49 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 7.8% | 11.7% | 15.6% | 19.4% | 23.3% | 27.2% | 31.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35% | 38.9% | 42.8% | 46.7% | 50.6% | 54.4% | 58.3% | 62.2% | 66.1% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 54 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.5% | 3.2% | 3.8% | 4.4% | 5.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.7% | 6.3% | 6.9% | 7.6% | 8.2% | 8.8% | 9.5% | 10.1% | 10.7% | 11.4% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 55 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 3.4% | 5.1% | 6.7% | 8.4% | 10.1% | 11.8% | 13.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15.2% | 16.8% | 18.5% | 20.2% | 21.9% | 23.6% | 25.3% | 26.9% | 28.6% | 30.3% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 56 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.7% | 16.4% | 19.2% | 21.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.6% | 27.4% | 30.1% | 32.8% | 35.6% | 38.3% | 41.1% | 43.8% | 46.5% | 49.3% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 57 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.7% | 18.4% | 22.1% | 25.8% | 29.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.2% | 36.8% | 40.5% | 44.2% | 47.9% | 51.6% | 55.3% | 58.9% | 62.6% | 66.3% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 58 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.4% | 6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 11.4% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 59 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 3.2% | 4.8% | 6.4% | 8% | 9.6% | 11.2% | 12.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 14.4% | 16% | 17.6% | 19.2% | 20.8% | 22.4% | 24% | 25.6% | 27.2% | 28.8% | 30.4% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 60 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 5.2% | 7.8% | 10.4% | 13% | 15.6% | 18.2% | 20.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23.4% | 26% | 28.6% | 31.2% | 33.8% | 36.4% | 39% | 41.6% | 44.2% | 46.8% | 49.4% | 52% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 61 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7% | 10.5% | 14% | 17.5% | 21% | 24.5% | 28% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.5% | 35% | 38.5% | 42% | 45.5% | 49% | 52.5% | 56% | 59.5% | 63% | 66.5% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 130 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 131 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 132 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.3% | 2% | 2.6% | 3.3% | 3.9% | 4.6% | 5.2% | 5.9% | 6.5% | 13% | 19.5% | 26% | 32.5% | 39% | 45.5% | 52% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 133 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.9% | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 4.4% | 5.3% | 6.2% | 7% | 7.9% | 8.8% | 17.5% | 26.3% | 35% | 43.8% | 52.5% | 61.3% | 70% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 134 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.7% | 4% | 5.3% | 6.7% | 8% | 9.3% | 10.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 135 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 7.1% | 10.7% | 14.2% | 17.8% | 21.3% | 24.9% | 28.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 136 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.6% | 17.3% | 23.1% | 28.9% | 34.7% | 40.4% | 46.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 137 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 5.5% | 6.2% | 7% | 7.8% | 15.6% | 23.3% | 31.1% | 38.9% | 46.7% | 54.4% | 62.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 138 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 4.8% | 6% | 7.2% | 8.4% | 9.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 139 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.4% | 9.6% | 12.8% | 16% | 19.2% | 22.4% | 25.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.8% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 140 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.6% | 4.2% | 4.7% | 5.2% | 10.4% | 15.6% | 20.8% | 26% | 31.2% | 36.4% | 41.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 46.8% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 141 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 63% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 142 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.1% | 2.2% | 3.3% | 4.4% | 5.5% | 6.5% | 7.6% | 8.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9.8% | 10.9% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 143 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 11.6% | 14.5% | 17.5% | 20.4% | 23.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26.2% | 29.1% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 144 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.4% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.5% | 14.2% | 18.9% | 23.6% | 28.4% | 33.1% | 37.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42.5% | 47.3% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 145 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 5.1% | 5.8% | 6.4% | 12.7% | 19.1% | 25.5% | 31.8% | 38.2% | 44.5% | 50.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 57.3% | 63.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 146 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9% | 10% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 147 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.3% | 8% | 10.7% | 13.3% | 16% | 18.7% | 21.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24% | 26.7% | 29.3% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 148 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 8.7% | 13% | 17.3% | 21.7% | 26% | 30.3% | 34.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39% | 43.3% | 47.7% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 149 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.7% | 17.5% | 23.3% | 29.2% | 35% | 40.8% | 46.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52.5% | 58.3% | 64.2% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 150 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.8% | 2.8% | 3.7% | 4.6% | 5.5% | 6.5% | 7.4% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 8.3% | 9.2% | 10.2% | 11.1% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 151 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.2% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 4.9% | 7.4% | 9.8% | 12.3% | 14.8% | 17.2% | 19.7% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.2% | 24.6% | 27.1% | 29.5% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 152 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 153 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.2% | 3.8% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 21.5% | 26.9% | 32.3% | 37.7% | 43.1% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48.5% | 53.8% | 59.2% | 64.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 154 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.7% | 2.6% | 3.4% | 4.3% | 5.1% | 6% | 6.9% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7.7% | 8.6% | 9.4% | 10.3% | 11.1% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 155 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.1% | 11.4% | 13.7% | 16% | 18.3% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.6% | 22.9% | 25.1% | 27.4% | 29.7% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 156 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.9% | 18.6% | 22.3% | 26% | 29.7% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.4% | 37.1% | 40.9% | 44.6% | 48.3% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 157 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 158 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7.2% | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 159 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 4.3% | 6.4% | 8.5% | 10.7% | 12.8% | 14.9% | 17.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19.2% | 21.3% | 23.5% | 25.6% | 27.7% | 29.9% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 160 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 6.9% | 10.4% | 13.9% | 17.3% | 20.8% | 24.3% | 27.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.2% | 34.7% | 38.1% | 41.6% | 45.1% | 48.5% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 161 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.3% | 14% | 18.7% | 23.3% | 28% | 32.7% | 37.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42% | 46.7% | 51.3% | 56% | 60.7% | 65.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 162 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 2.3% | 3% | 3.8% | 4.5% | 5.3% | 6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9% | 9.8% | 10.5% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 163 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 164 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.6% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.5% | 9.8% | 13% | 16.3% | 19.5% | 22.8% | 26% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29.3% | 32.5% | 35.8% | 39% | 42.3% | 45.5% | 48.8% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 165 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.4% | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 30.6% | 35% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39.4% | 43.8% | 48.1% | 52.5% | 56.9% | 61.3% | 65.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 170 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.4% | 7.1% | 7.8% | 8.5% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 171 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 13.2% | 15.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16.9% | 18.8% | 20.7% | 22.6% | 24.5% | 26.4% | 28.2% | 30.1% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 172 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 6.1% | 9.2% | 12.2% | 15.3% | 18.4% | 21.4% | 24.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27.5% | 30.6% | 33.6% | 36.7% | 39.8% | 42.8% | 45.9% | 48.9% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 173 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | 4.1% | 8.2% | 12.4% | 16.5% | 20.6% | 24.7% | 28.8% | 32.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 37.1% | 41.2% | 45.3% | 49.4% | 53.5% | 57.6% | 61.8% | 65.9% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 166 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.3% | 2% | 2.7% | 3.3% | 4% | 4.7% | 5.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6% | 6.7% | 7.3% | 8% | 8.7% | 9.3% | 10% | 10.7% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 167 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.6% | 5.3% | 7.1% | 8.9% | 10.7% | 12.4% | 14.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16% | 17.8% | 19.6% | 21.3% | 23.1% | 24.9% | 26.7% | 28.4% | 30.2% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 168 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 11.6% | 14.4% | 17.3% | 20.2% | 23.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26% | 28.9% | 31.8% | 34.7% | 37.6% | 40.4% | 43.3% | 46.2% | 49.1% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 169 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 7.8% | 11.7% | 15.6% | 19.4% | 23.3% | 27.2% | 31.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35% | 38.9% | 42.8% | 46.7% | 50.6% | 54.4% | 58.3% | 62.2% | 66.1% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 174 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.5% | 3.2% | 3.8% | 4.4% | 5.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.7% | 6.3% | 6.9% | 7.6% | 8.2% | 8.8% | 9.5% | 10.1% | 10.7% | 11.4% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 175 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 3.4% | 5.1% | 6.7% | 8.4% | 10.1% | 11.8% | 13.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15.2% | 16.8% | 18.5% | 20.2% | 21.9% | 23.6% | 25.3% | 26.9% | 28.6% | 30.3% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 176 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.7% | 16.4% | 19.2% | 21.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.6% | 27.4% | 30.1% | 32.8% | 35.6% | 38.3% | 41.1% | 43.8% | 46.5% | 49.3% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 177 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.7% | 18.4% | 22.1% | 25.8% | 29.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.2% | 36.8% | 40.5% | 44.2% | 47.9% | 51.6% | 55.3% | 58.9% | 62.6% | 66.3% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 178 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.4% | 6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 11.4% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 179 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 3.2% | 4.8% | 6.4% | 8% | 9.6% | 11.2% | 12.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 14.4% | 16% | 17.6% | 19.2% | 20.8% | 22.4% | 24% | 25.6% | 27.2% | 28.8% | 30.4% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 180 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 5.2% | 7.8% | 10.4% | 13% | 15.6% | 18.2% | 20.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23.4% | 26% | 28.6% | 31.2% | 33.8% | 36.4% | 39% | 41.6% | 44.2% | 46.8% | 49.4% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 181 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7% | 10.5% | 14% | 17.5% | 21% | 24.5% | 28% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.5% | 35% | 38.5% | 42% | 45.5% | 49% | 52.5% | 56% | 59.5% | 63% | 66.5% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 257 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 258 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 259 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.3% | 2% | 2.6% | 3.3% | 3.9% | 4.6% | 5.2% | 5.9% | 6.5% | 13% | 19.5% | 26% | 32.5% | 39% | 45.5% | 52% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 260 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 8 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.9% | 1.8% | 2.6% | 3.5% | 4.4% | 5.3% | 6.2% | 7% | 7.9% | 8.8% | 17.5% | 26.3% | 35% | 43.8% | 52.5% | 61.3% | 70% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 261 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.7% | 4% | 5.3% | 6.7% | 8% | 9.3% | 10.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 262 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 7.1% | 10.7% | 14.2% | 17.8% | 21.3% | 24.9% | 28.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 263 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.6% | 17.3% | 23.1% | 28.9% | 34.7% | 40.4% | 46.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 264 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 9 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.8% | 1.6% | 2.3% | 3.1% | 3.9% | 4.7% | 5.5% | 6.2% | 7% | 7.8% | 15.6% | 23.3% | 31.1% | 38.9% | 46.7% | 54.4% | 62.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 265 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 4.8% | 6% | 7.2% | 8.4% | 9.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 266 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.4% | 9.6% | 12.8% | 16% | 19.2% | 22.4% | 25.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.8% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 267 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.6% | 4.2% | 4.7% | 5.2% | 10.4% | 15.6% | 20.8% | 26% | 31.2% | 36.4% | 41.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 46.8% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 268 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 63% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 269 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.1% | 2.2% | 3.3% | 4.4% | 5.5% | 6.5% | 7.6% | 8.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9.8% | 10.9% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 270 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 11.6% | 14.5% | 17.5% | 20.4% | 23.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26.2% | 29.1% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 271 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.4% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.5% | 14.2% | 18.9% | 23.6% | 28.4% | 33.1% | 37.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42.5% | 47.3% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 272 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 5.1% | 5.8% | 6.4% | 12.7% | 19.1% | 25.5% | 31.8% | 38.2% | 44.5% | 50.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 57.3% | 63.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 273 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9% | 10% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 274 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.3% | 8% | 10.7% | 13.3% | 16% | 18.7% | 21.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24% | 26.7% | 29.3% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 275 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 8.7% | 13% | 17.3% | 21.7% | 26% | 30.3% | 34.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39% | 43.3% | 47.7% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 276 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.7% | 17.5% | 23.3% | 29.2% | 35% | 40.8% | 46.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52.5% | 58.3% | 64.2% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 277 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.8% | 2.8% | 3.7% | 4.6% | 5.5% | 6.5% | 7.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 8.3% | 9.2% | 10.2% | 11.1% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 278 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 4.9% | 7.4% | 9.8% | 12.3% | 14.8% | 17.2% | 19.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.2% | 24.6% | 27.1% | 29.5% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 279 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 280 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.2% | 3.8% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 21.5% | 26.9% | 32.3% | 37.7% | 43.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48.5% | 53.8% | 59.2% | 64.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 281 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.7% | 2.6% | 3.4% | 4.3% | 5.1% | 6% | 6.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7.7% | 8.6% | 9.4% | 10.3% | 11.1% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 282 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.1% | 11.4% | 13.7% | 16% | 18.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.6% | 22.9% | 25.1% | 27.4% | 29.7% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 283 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.9% | 18.6% | 22.3% | 26% | 29.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.4% | 37.1% | 40.9% | 44.6% | 48.3% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 284 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 285 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4% | 4.8% | 5.6% | 6.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7.2% | 8% | 8.8% | 9.6% | 10.4% | 11.2% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 286 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 4.3% | 6.4% | 8.5% | 10.7% | 12.8% | 14.9% | 17.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19.2% | 21.3% | 23.5% | 25.6% | 27.7% | 29.9% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 287 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 6.9% | 10.4% | 13.9% | 17.3% | 20.8% | 24.3% | 27.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.2% | 34.7% | 38.1% | 41.6% | 45.1% | 48.5% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 288 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.3% | 14% | 18.7% | 23.3% | 28% | 32.7% | 37.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42% | 46.7% | 51.3% | 56% | 60.7% | 65.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 289 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 2.3% | 3% | 3.8% | 4.5% | 5.3% | 6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9% | 9.8% | 10.5% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 290 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 291 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.6% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.5% | 9.8% | 13% | 16.3% | 19.5% | 22.8% | 26% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29.3% | 32.5% | 35.8% | 39% | 42.3% | 45.5% | 48.8% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 292 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.4% | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 30.6% | 35% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39.4% | 43.8% | 48.1% | 52.5% | 56.9% | 61.3% | 65.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 297 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6.4% | 7.1% | 7.8% | 8.5% | 9.2% | 9.9% | 10.6% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 298 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 13.2% | 15.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16.9% | 18.8% | 20.7% | 22.6% | 24.5% | 26.4% | 28.2% | 30.1% | 32% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 299 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 3.1% | 6.1% | 9.2% | 12.2% | 15.3% | 18.4% | 21.4% | 24.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27.5% | 30.6% | 33.6% | 36.7% | 39.8% | 42.8% | 45.9% | 48.9% | 52% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 300 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | 4.1% | 8.2% | 12.4% | 16.5% | 20.6% | 24.7% | 28.8% | 32.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 37.1% | 41.2% | 45.3% | 49.4% | 53.5% | 57.6% | 61.8% | 65.9% | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 293 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 1.3% | 2% | 2.7% | 3.3% | 4% | 4.7% | 5.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 6% | 6.7% | 7.3% | 8% | 8.7% | 9.3% | 10% | 10.7% | 11.3% | 12% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 294 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.6% | 5.3% | 7.1% | 8.9% | 10.7% | 12.4% | 14.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16% | 17.8% | 19.6% | 21.3% | 23.1% | 24.9% | 26.7% | 28.4% | 30.2% | 32% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 295 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.7% | 11.6% | 14.4% | 17.3% | 20.2% | 23.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26% | 28.9% | 31.8% | 34.7% | 37.6% | 40.4% | 43.3% | 46.2% | 49.1% | 52% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 296 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 7.8% | 11.7% | 15.6% | 19.4% | 23.3% | 27.2% | 31.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35% | 38.9% | 42.8% | 46.7% | 50.6% | 54.4% | 58.3% | 62.2% | 66.1% | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 301 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.5% | 3.2% | 3.8% | 4.4% | 5.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.7% | 6.3% | 6.9% | 7.6% | 8.2% | 8.8% | 9.5% | 10.1% | 10.7% | 11.4% | 12% | 12% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 302 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 3.4% | 5.1% | 6.7% | 8.4% | 10.1% | 11.8% | 13.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15.2% | 16.8% | 18.5% | 20.2% | 21.9% | 23.6% | 25.3% | 26.9% | 28.6% | 30.3% | 32% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 303 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.7% | 16.4% | 19.2% | 21.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.6% | 27.4% | 30.1% | 32.8% | 35.6% | 38.3% | 41.1% | 43.8% | 46.5% | 49.3% | 52% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 304 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.7% | 18.4% | 22.1% | 25.8% | 29.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.2% | 36.8% | 40.5% | 44.2% | 47.9% | 51.6% | 55.3% | 58.9% | 62.6% | 66.3% | 70% | 70% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 305 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.4% | 6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% | 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 11.4% | 12% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 306 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 3.2% | 4.8% | 6.4% | 8% | 9.6% | 11.2% | 12.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 14.4% | 16% | 17.6% | 19.2% | 20.8% | 22.4% | 24% | 25.6% | 27.2% | 28.8% | 30.4% | 32% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 307 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 5.2% | 7.8% | 10.4% | 13% | 15.6% | 18.2% | 20.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23.4% | 26% | 28.6% | 31.2% | 33.8% | 36.4% | 39% | 41.6% | 44.2% | 46.8% | 49.4% | 52% | - | - | - | - | - | - |

## Tabela numer 308 - Tytoń ciemny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7% | 10.5% | 14% | 17.5% | 21% | 24.5% | 28% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.5% | 35% | 38.5% | 42% | 45.5% | 49% | 52.5% | 56% | 59.5% | 63% | 66.5% | 70% | - | - | - | - | - | - |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 88. Tytoń jasny

### Tabela numer 62 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

### Tabela numer 63 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

### Tabela numer 64 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | 5.4% | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 54% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

### Tabela numer 65 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 63% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

### Tabela numer 66 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.3% | 3.8% | 4.4% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.9% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

### Tabela numer 67 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.6% | 16.4% | 19.1% | 21.8% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.5% | 27.3% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

### Tabela numer 68 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.5% | 1.1% | 1.7% | 2.2% | 2.7% | 3.3% | 3.9% | 4.4% | 5% | 5.5% | 10.9% | 16.4% | 21.8% | 27.3% | 32.7% | 38.2% | 43.6% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 49.1% | 54.5% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 69 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 5.1% | 5.8% | 6.4% | 12.7% | 19.1% | 25.5% | 31.8% | 38.2% | 44.5% | 50.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 57.3% | 63.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 70 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 71 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 72 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 73 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.7% | 17.5% | 23.3% | 29.2% | 35% | 40.8% | 46.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52.5% | 58.3% | 64.2% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 74 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.8% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 3.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.2% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 75 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.2% | 11.5% | 13.8% | 16.2% | 18.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.8% | 23.1% | 25.4% | 27.7% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 76 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.8% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 3.7% | 4.1% | 4.6% | 9.2% | 13.8% | 18.5% | 23.1% | 27.7% | 32.3% | 36.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 41.5% | 46.2% | 50.8% | 55.4% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 77 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.2% | 3.8% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 21.5% | 26.9% | 32.3% | 37.7% | 43.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48.5% | 53.8% | 59.2% | 64.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 78 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 3% | 3.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.9% | 4.3% | 4.7% | 5.1% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 79 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 4.3% | 6.4% | 8.6% | 10.7% | 12.9% | 15% | 17.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19.3% | 21.4% | 23.6% | 25.7% | 27.9% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 80 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 8.6% | 12.9% | 17.1% | 21.4% | 25.7% | 30% | 34.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 38.6% | 42.9% | 47.1% | 51.4% | 55.7% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 81 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 82 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.6% | 4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 83 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 84 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 85 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.3% | 14% | 18.7% | 23.3% | 28% | 32.7% | 37.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42% | 46.7% | 51.3% | 56% | 60.7% | 65.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 86 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.3% | 2.6% | 3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.4% | 3.8% | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 87 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 13.1% | 15% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16.9% | 18.8% | 20.6% | 22.5% | 24.4% | 26.3% | 28.1% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 88 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3% | 3.4% | 3.8% | 7.5% | 11.3% | 15% | 18.8% | 22.5% | 26.3% | 30% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.8% | 37.5% | 41.3% | 45% | 48.8% | 52.5% | 56.3% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 89 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.4% | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 30.6% | 35% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39.4% | 43.8% | 48.1% | 52.5% | 56.9% | 61.3% | 65.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 90 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.2% | 3.5% | 3.9% | 4.2% | 4.6% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 91 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.5% | 5.3% | 7.1% | 8.8% | 10.6% | 12.4% | 14.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15.9% | 17.6% | 19.4% | 21.2% | 22.9% | 24.7% | 26.5% | 28.2% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 92 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7.1% | 10.6% | 14.1% | 17.6% | 21.2% | 24.7% | 28.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.8% | 35.3% | 38.8% | 42.4% | 45.9% | 49.4% | 52.9% | 56.5% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 93 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | 4.1% | 8.2% | 12.4% | 16.5% | 20.6% | 24.7% | 28.8% | 32.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 37.1% | 41.2% | 45.3% | 49.4% | 53.5% | 57.6% | 61.8% | 65.9% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 94 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3% | 3.3% | 3.7% | 4% | 4.3% | 4.7% | 5% | 5.3% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 95 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 3.3% | 5% | 6.7% | 8.3% | 10% | 11.7% | 13.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15% | 16.7% | 18.3% | 20% | 21.7% | 23.3% | 25% | 26.7% | 28.3% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 96 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.7% | 10% | 13.3% | 16.7% | 20% | 23.3% | 26.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30% | 33.3% | 36.7% | 40% | 43.3% | 46.7% | 50% | 53.3% | 56.7% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 97 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 7.8% | 11.7% | 15.6% | 19.4% | 23.3% | 27.2% | 31.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35% | 38.9% | 42.8% | 46.7% | 50.6% | 54.4% | 58.3% | 62.2% | 66.1% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 98 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.8% | 3.2% | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 99 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 3.2% | 4.7% | 6.3% | 7.9% | 9.5% | 11.1% | 12.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 14.2% | 15.8% | 17.4% | 18.9% | 20.5% | 22.1% | 23.7% | 25.3% | 26.8% | 28.4% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 100 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.3% | 9.5% | 12.6% | 15.8% | 18.9% | 22.1% | 25.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.4% | 31.6% | 34.7% | 37.9% | 41.1% | 44.2% | 47.4% | 50.5% | 53.7% | 56.8% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 101 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.7% | 18.4% | 22.1% | 25.8% | 29.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.2% | 36.8% | 40.5% | 44.2% | 47.9% | 51.6% | 55.3% | 58.9% | 62.6% | 66.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 102 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.7% | 3% | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 103 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13.5% | 15% | 16.5% | 18% | 19.5% | 21% | 22.5% | 24% | 25.5% | 27% | 28.5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 104 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 105 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7% | 10.5% | 14% | 17.5% | 21% | 24.5% | 28% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.5% | 35% | 38.5% | 42% | 45.5% | 49% | 52.5% | 56% | 59.5% | 63% | 66.5% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 106 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.7% | 4% | 4.3% | 4.6% | 4.9% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 107 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 2.9% | 4.3% | 5.7% | 7.1% | 8.6% | 10% | 11.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.9% | 14.3% | 15.7% | 17.1% | 18.6% | 20% | 21.4% | 22.9% | 24.3% | 25.7% | 27.1% | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 108 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.7% | 8.6% | 11.4% | 14.3% | 17.1% | 20% | 22.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25.7% | 28.6% | 31.4% | 34.3% | 37.1% | 40% | 42.9% | 45.7% | 48.6% | 51.4% | 54.3% | 57.1% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 109 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.7% | 10% | 13.3% | 16.7% | 20% | 23.3% | 26.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30% | 33.3% | 36.7% | 40% | 43.3% | 46.7% | 50% | 53.3% | 56.7% | 60% | 63.3% | 66.7% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 110 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.5% | 2.7% | 3% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.6% | 4.9% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 111 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 2.7% | 4.1% | 5.5% | 6.8% | 8.2% | 9.5% | 10.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.3% | 13.6% | 15% | 16.4% | 17.7% | 19.1% | 20.5% | 21.8% | 23.2% | 24.5% | 25.9% | 27.3% | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 112 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.6% | 16.4% | 19.1% | 21.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.5% | 27.3% | 30% | 32.7% | 35.5% | 38.2% | 40.9% | 43.6% | 46.4% | 49.1% | 51.8% | 54.5% | 57.3% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 113 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.4% | 9.5% | 12.7% | 15.9% | 19.1% | 22.3% | 25.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.6% | 31.8% | 35% | 38.2% | 41.4% | 44.5% | 47.7% | 50.9% | 54.1% | 57.3% | 60.5% | 63.6% | 66.8% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 114 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.3% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.7% | 5% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 115 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.6% | 3.9% | 5.2% | 6.5% | 7.8% | 9.1% | 10.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 11.7% | 13% | 14.3% | 15.7% | 17% | 18.3% | 19.6% | 20.9% | 22.2% | 23.5% | 24.8% | 26.1% | 27.4% | 28.7% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 116 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 5.2% | 7.8% | 10.4% | 13% | 15.7% | 18.3% | 20.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23.5% | 26.1% | 28.7% | 31.3% | 33.9% | 36.5% | 39.1% | 41.7% | 44.3% | 47% | 49.6% | 52.2% | 54.8% | 57.4% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 117 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6.1% | 9.1% | 12.2% | 15.2% | 18.3% | 21.3% | 24.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27.4% | 30.4% | 33.5% | 36.5% | 39.6% | 42.6% | 45.7% | 48.7% | 51.7% | 54.8% | 57.8% | 60.9% | 63.9% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 118 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 4% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 5% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 119 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 8.8% | 10% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 11.3% | 12.5% | 13.8% | 15% | 16.3% | 17.5% | 18.8% | 20% | 21.3% | 22.5% | 23.8% | 25% | 26.3% | 27.5% | 28.8% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 120 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 32.5% | 35% | 37.5% | 40% | 42.5% | 45% | 47.5% | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 121 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.8% | 11.7% | 14.6% | 17.5% | 20.4% | 23.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26.3% | 29.2% | 32.1% | 35% | 37.9% | 40.8% | 43.8% | 46.7% | 49.6% | 52.5% | 55.4% | 58.3% | 61.3% | 64.2% | 67.1% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 122 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.3% | 4.6% | 4.8% | 5% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6% |

## Tabela numer 123 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 4.8% | 6% | 7.2% | 8.4% | 9.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.8% | 12% | 13.2% | 14.4% | 15.6% | 16.8% | 18% | 19.2% | 20.4% | 21.6% | 22.8% | 24% | 25.2% | 26.4% | 27.6% | 28.8% | 30% | 30% |

## Tabela numer 124 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 4.8% | 7.2% | 9.6% | 12% | 14.4% | 16.8% | 19.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 21.6% | 24% | 26.4% | 28.8% | 31.2% | 33.6% | 36% | 38.4% | 40.8% | 43.2% | 45.6% | 48% | 50.4% | 52.8% | 55.2% | 57.6% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 125 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 5.6% | 8.4% | 11.2% | 14% | 16.8% | 19.6% | 22.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25.2% | 28% | 30.8% | 33.6% | 36.4% | 39.2% | 42% | 44.8% | 47.6% | 50.4% | 53.2% | 56% | 58.8% | 61.6% | 64.4% | 67.2% | 70% | 70% |

## Tabela numer 126 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.5% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% |

## Tabela numer 127 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.3% | 3.5% | 4.6% | 5.8% | 6.9% | 8.1% | 9.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.4% | 11.5% | 12.7% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.3% | 18.5% | 19.6% | 20.8% | 21.9% | 23.1% | 24.2% | 25.4% | 26.5% | 27.7% | 28.8% | 30% |

## Tabela numer 128 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.2% | 11.5% | 13.8% | 16.2% | 18.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.8% | 23.1% | 25.4% | 27.7% | 30% | 32.3% | 34.6% | 36.9% | 39.2% | 41.5% | 43.8% | 46.2% | 48.5% | 50.8% | 53.1% | 55.4% | 57.7% | 60% |

## Tabela numer 129 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.4% | 8.1% | 10.8% | 13.5% | 16.2% | 18.8% | 21.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.2% | 26.9% | 29.6% | 32.3% | 35% | 37.7% | 40.4% | 43.1% | 45.8% | 48.5% | 51.2% | 53.8% | 56.5% | 59.2% | 61.9% | 64.6% | 67.3% | 70% |

## Tabela numer 182 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 183 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 184 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | 5.4% | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 54% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 185 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 63% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 186 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.3% | 3.8% | 4.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.9% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 187 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.6% | 16.4% | 19.1% | 21.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.5% | 27.3% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 188 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1.1% | 1.7% | 2.2% | 2.7% | 3.3% | 3.9% | 4.4% | 5% | 5.5% | 10.9% | 16.4% | 21.8% | 27.3% | 32.7% | 38.2% | 43.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 49.1% | 54.5% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 189 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 5.1% | 5.8% | 6.4% | 12.7% | 19.1% | 25.5% | 31.8% | 38.2% | 44.5% | 50.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 57.3% | 63.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 190 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 191 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 192 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 193 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.7% | 17.5% | 23.3% | 29.2% | 35% | 40.8% | 46.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52.5% | 58.3% | 64.2% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 194 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.8% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 3.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.2% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 195 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.2% | 11.5% | 13.8% | 16.2% | 18.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.8% | 23.1% | 25.4% | 27.7% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 196 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.8% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 3.7% | 4.1% | 4.6% | 9.2% | 13.8% | 18.5% | 23.1% | 27.7% | 32.3% | 36.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 41.5% | 46.2% | 50.8% | 55.4% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 197 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.2% | 3.8% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 21.5% | 26.9% | 32.3% | 37.7% | 43.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48.5% | 53.8% | 59.2% | 64.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 198 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 3% | 3.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.9% | 4.3% | 4.7% | 5.1% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 199 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 4.3% | 6.4% | 8.6% | 10.7% | 12.9% | 15% | 17.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19.3% | 21.4% | 23.6% | 25.7% | 27.9% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 200 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 8.6% | 12.9% | 17.1% | 21.4% | 25.7% | 30% | 34.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 38.6% | 42.9% | 47.1% | 51.4% | 55.7% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 201 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 202 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.6% | 4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 203 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 204 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 205 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.3% | 14% | 18.7% | 23.3% | 28% | 32.7% | 37.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42% | 46.7% | 51.3% | 56% | 60.7% | 65.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 206 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.3% | 2.6% | 3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.4% | 3.8% | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 207 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 13.1% | 15% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16.9% | 18.8% | 20.6% | 22.5% | 24.4% | 26.3% | 28.1% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 208 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3% | 3.4% | 3.8% | 7.5% | 11.3% | 15% | 18.8% | 22.5% | 26.3% | 30% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.8% | 37.5% | 41.3% | 45% | 48.8% | 52.5% | 56.3% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 209 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.4% | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 30.6% | 35% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39.4% | 43.8% | 48.1% | 52.5% | 56.9% | 61.3% | 65.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 210 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.2% | 3.5% | 3.9% | 4.2% | 4.6% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 211 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.5% | 5.3% | 7.1% | 8.8% | 10.6% | 12.4% | 14.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15.9% | 17.6% | 19.4% | 21.2% | 22.9% | 24.7% | 26.5% | 28.2% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 212 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7.1% | 10.6% | 14.1% | 17.6% | 21.2% | 24.7% | 28.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.8% | 35.3% | 38.8% | 42.4% | 45.9% | 49.4% | 52.9% | 56.5% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 213 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | 4.1% | 8.2% | 12.4% | 16.5% | 20.6% | 24.7% | 28.8% | 32.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 37.1% | 41.2% | 45.3% | 49.4% | 53.5% | 57.6% | 61.8% | 65.9% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 214 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3% | 3.3% | 3.7% | 4% | 4.3% | 4.7% | 5% | 5.3% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 215 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 3.3% | 5% | 6.7% | 8.3% | 10% | 11.7% | 13.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15% | 16.7% | 18.3% | 20% | 21.7% | 23.3% | 25% | 26.7% | 28.3% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 216 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.7% | 10% | 13.3% | 16.7% | 20% | 23.3% | 26.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30% | 33.3% | 36.7% | 40% | 43.3% | 46.7% | 50% | 53.3% | 56.7% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 217 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 7.8% | 11.7% | 15.6% | 19.4% | 23.3% | 27.2% | 31.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35% | 38.9% | 42.8% | 46.7% | 50.6% | 54.4% | 58.3% | 62.2% | 66.1% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 218 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.8% | 3.2% | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 219 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 3.2% | 4.7% | 6.3% | 7.9% | 9.5% | 11.1% | 12.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 14.2% | 15.8% | 17.4% | 18.9% | 20.5% | 22.1% | 23.7% | 25.3% | 26.8% | 28.4% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 220 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.3% | 9.5% | 12.6% | 15.8% | 18.9% | 22.1% | 25.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.4% | 31.6% | 34.7% | 37.9% | 41.1% | 44.2% | 47.4% | 50.5% | 53.7% | 56.8% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 221 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.7% | 18.4% | 22.1% | 25.8% | 29.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.2% | 36.8% | 40.5% | 44.2% | 47.9% | 51.6% | 55.3% | 58.9% | 62.6% | 66.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 222 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.7% | 3% | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 223 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13.5% | 15% | 16.5% | 18% | 19.5% | 21% | 22.5% | 24% | 25.5% | 27% | 28.5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 224 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 225 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7% | 10.5% | 14% | 17.5% | 21% | 24.5% | 28% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.5% | 35% | 38.5% | 42% | 45.5% | 49% | 52.5% | 56% | 59.5% | 63% | 66.5% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 226 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.7% | 4% | 4.3% | 4.6% | 4.9% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 227 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 2.9% | 4.3% | 5.7% | 7.1% | 8.6% | 10% | 11.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.9% | 14.3% | 15.7% | 17.1% | 18.6% | 20% | 21.4% | 22.9% | 24.3% | 25.7% | 27.1% | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 228 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.7% | 8.6% | 11.4% | 14.3% | 17.1% | 20% | 22.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25.7% | 28.6% | 31.4% | 34.3% | 37.1% | 40% | 42.9% | 45.7% | 48.6% | 51.4% | 54.3% | 57.1% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 229 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.7% | 10% | 13.3% | 16.7% | 20% | 23.3% | 26.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30% | 33.3% | 36.7% | 40% | 43.3% | 46.7% | 50% | 53.3% | 56.7% | 60% | 63.3% | 66.7% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 230 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.5% | 2.7% | 3% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.6% | 4.9% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 231 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 2.7% | 4.1% | 5.5% | 6.8% | 8.2% | 9.5% | 10.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.3% | 13.6% | 15% | 16.4% | 17.7% | 19.1% | 20.5% | 21.8% | 23.2% | 24.5% | 25.9% | 27.3% | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 232 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.6% | 16.4% | 19.1% | 21.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.5% | 27.3% | 30% | 32.7% | 35.5% | 38.2% | 40.9% | 43.6% | 46.4% | 49.1% | 51.8% | 54.5% | 57.3% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 233 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.4% | 9.5% | 12.7% | 15.9% | 19.1% | 22.3% | 25.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.6% | 31.8% | 35% | 38.2% | 41.4% | 44.5% | 47.7% | 50.9% | 54.1% | 57.3% | 60.5% | 63.6% | 66.8% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 234 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.3% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.7% | 5% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 235 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.6% | 3.9% | 5.2% | 6.5% | 7.8% | 9.1% | 10.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 11.7% | 13% | 14.3% | 15.7% | 17% | 18.3% | 19.6% | 20.9% | 22.2% | 23.5% | 24.8% | 26.1% | 27.4% | 28.7% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 236 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 5.2% | 7.8% | 10.4% | 13% | 15.7% | 18.3% | 20.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23.5% | 26.1% | 28.7% | 31.3% | 33.9% | 36.5% | 39.1% | 41.7% | 44.3% | 47% | 49.6% | 52.2% | 54.8% | 57.4% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 237 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6.1% | 9.1% | 12.2% | 15.2% | 18.3% | 21.3% | 24.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27.4% | 30.4% | 33.5% | 36.5% | 39.6% | 42.6% | 45.7% | 48.7% | 51.7% | 54.8% | 57.8% | 60.9% | 63.9% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 238 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 4% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 5% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 239 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 8.8% | 10% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 11.3% | 12.5% | 13.8% | 15% | 16.3% | 17.5% | 18.8% | 20% | 21.3% | 22.5% | 23.8% | 25% | 26.3% | 27.5% | 28.8% | 30% | 30% | 30% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 240 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 32.5% | 35% | 37.5% | 40% | 42.5% | 45% | 47.5% | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 241 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.8% | 11.7% | 14.6% | 17.5% | 20.4% | 23.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26.3% | 29.2% | 32.1% | 35% | 37.9% | 40.8% | 43.8% | 46.7% | 49.6% | 52.5% | 55.4% | 58.3% | 61.3% | 64.2% | 67.1% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 242 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.3% | 4.6% | 4.8% | 5% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6% |

## Tabela numer 243 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 4.8% | 6% | 7.2% | 8.4% | 9.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.8% | 12% | 13.2% | 14.4% | 15.6% | 16.8% | 18% | 19.2% | 20.4% | 21.6% | 22.8% | 24% | 25.2% | 26.4% | 27.6% | 28.8% | 30% | 30% |

## Tabela numer 244 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 4.8% | 7.2% | 9.6% | 12% | 14.4% | 16.8% | 19.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 21.6% | 24% | 26.4% | 28.8% | 31.2% | 33.6% | 36% | 38.4% | 40.8% | 43.2% | 45.6% | 48% | 50.4% | 52.8% | 55.2% | 57.6% | 60% | 60% |

## Tabela numer 245 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 5.6% | 8.4% | 11.2% | 14% | 16.8% | 19.6% | 22.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25.2% | 28% | 30.8% | 33.6% | 36.4% | 39.2% | 42% | 44.8% | 47.6% | 50.4% | 53.2% | 56% | 58.8% | 61.6% | 64.4% | 67.2% | 70% | 70% |

## Tabela numer 246 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.5% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 247 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.3% | 3.5% | 4.6% | 5.8% | 6.9% | 8.1% | 9.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.4% | 11.5% | 12.7% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.3% | 18.5% | 19.6% | 20.8% | 21.9% | 23.1% | 24.2% | 25.4% | 26.5% | 27.7% | 28.8% | 30% |

## Tabela numer 248 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.2% | 11.5% | 13.8% | 16.2% | 18.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.8% | 23.1% | 25.4% | 27.7% | 30% | 32.3% | 34.6% | 36.9% | 39.2% | 41.5% | 43.8% | 46.2% | 48.5% | 50.8% | 53.1% | 55.4% | 57.7% | 60% |

## Tabela numer 249 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.4% | 8.1% | 10.8% | 13.5% | 16.2% | 18.8% | 21.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.2% | 26.9% | 29.6% | 32.3% | 35% | 37.7% | 40.4% | 43.1% | 45.8% | 48.5% | 51.2% | 53.8% | 56.5% | 59.2% | 61.9% | 64.6% | 67.3% | 70% |

## Tabela numer 309 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5.4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 310 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 311 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.8% | 2.4% | 3% | 3.6% | 4.2% | 4.8% | 5.4% | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | 36% | 42% | 48% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 54% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 312 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 10 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | 4.2% | 4.9% | 5.6% | 6.3% | 7% | 14% | 21% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 63% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 313 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.3% | 3.8% | 4.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.9% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 314 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.6% | 16.4% | 19.1% | 21.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.5% | 27.3% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 315 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1.1% | 1.7% | 2.2% | 2.7% | 3.3% | 3.9% | 4.4% | 5% | 5.5% | 10.9% | 16.4% | 21.8% | 27.3% | 32.7% | 38.2% | 43.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 49.1% | 54.5% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 316 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 11 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.8% | 4.5% | 5.1% | 5.8% | 6.4% | 12.7% | 19.1% | 25.5% | 31.8% | 38.2% | 44.5% | 50.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 57.3% | 63.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 317 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.5% | 5% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 318 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 319 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 320 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 12 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.6% | 1.2% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 4.1% | 4.6% | 5.2% | 5.8% | 11.7% | 17.5% | 23.3% | 29.2% | 35% | 40.8% | 46.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52.5% | 58.3% | 64.2% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 321 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.8% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 3.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4.2% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 322 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.2% | 11.5% | 13.8% | 16.2% | 18.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.8% | 23.1% | 25.4% | 27.7% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 323 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.8% | 2.3% | 2.8% | 3.2% | 3.7% | 4.1% | 4.6% | 9.2% | 13.8% | 18.5% | 23.1% | 27.7% | 32.3% | 36.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 41.5% | 46.2% | 50.8% | 55.4% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 324 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 13 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1.1% | 1.6% | 2.2% | 2.7% | 3.2% | 3.8% | 4.3% | 4.9% | 5.4% | 10.8% | 16.2% | 21.5% | 26.9% | 32.3% | 37.7% | 43.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48.5% | 53.8% | 59.2% | 64.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 325 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 3% | 3.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.9% | 4.3% | 4.7% | 5.1% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 326 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% | 4.3% | 6.4% | 8.6% | 10.7% | 12.9% | 15% | 17.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 19.3% | 21.4% | 23.6% | 25.7% | 27.9% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 327 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 3% | 3.4% | 3.9% | 4.3% | 8.6% | 12.9% | 17.1% | 21.4% | 25.7% | 30% | 34.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 38.6% | 42.9% | 47.1% | 51.4% | 55.7% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 328 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 14 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 329 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.6% | 4% | 4.4% | 4.8% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 330 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 331 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 3.6% | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 332 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 15 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.5% | 0.9% | 1.4% | 1.9% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 4.2% | 4.7% | 9.3% | 14% | 18.7% | 23.3% | 28% | 32.7% | 37.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 42% | 46.7% | 51.3% | 56% | 60.7% | 65.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 333 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.3% | 2.6% | 3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.4% | 3.8% | 4.1% | 4.5% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 334 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.7% | 1.9% | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 13.1% | 15% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 16.9% | 18.8% | 20.6% | 22.5% | 24.4% | 26.3% | 28.1% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 335 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3% | 3.4% | 3.8% | 7.5% | 11.3% | 15% | 18.8% | 22.5% | 26.3% | 30% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.8% | 37.5% | 41.3% | 45% | 48.8% | 52.5% | 56.3% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 336 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 16 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.9% | 1.3% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 4% | 4.4% | 8.8% | 13.1% | 17.5% | 21.9% | 26.3% | 30.6% | 35% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39.4% | 43.8% | 48.1% | 52.5% | 56.9% | 61.3% | 65.6% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 337 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3.2% | 3.5% | 3.9% | 4.2% | 4.6% | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 338 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 3.5% | 5.3% | 7.1% | 8.8% | 10.6% | 12.4% | 14.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15.9% | 17.6% | 19.4% | 21.2% | 22.9% | 24.7% | 26.5% | 28.2% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 339 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7.1% | 10.6% | 14.1% | 17.6% | 21.2% | 24.7% | 28.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.8% | 35.3% | 38.8% | 42.4% | 45.9% | 49.4% | 52.9% | 56.5% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 340 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 17 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 3.7% | 4.1% | 8.2% | 12.4% | 16.5% | 20.6% | 24.7% | 28.8% | 32.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 37.1% | 41.2% | 45.3% | 49.4% | 53.5% | 57.6% | 61.8% | 65.9% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 341 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 3% | 3.3% | 3.7% | 4% | 4.3% | 4.7% | 5% | 5.3% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 342 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 1.7% | 3.3% | 5% | 6.7% | 8.3% | 10% | 11.7% | 13.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 15% | 16.7% | 18.3% | 20% | 21.7% | 23.3% | 25% | 26.7% | 28.3% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 343 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.7% | 10% | 13.3% | 16.7% | 20% | 23.3% | 26.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30% | 33.3% | 36.7% | 40% | 43.3% | 46.7% | 50% | 53.3% | 56.7% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 344 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 18 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.8% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 7.8% | 11.7% | 15.6% | 19.4% | 23.3% | 27.2% | 31.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35% | 38.9% | 42.8% | 46.7% | 50.6% | 54.4% | 58.3% | 62.2% | 66.1% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 345 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.8% | 3.2% | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 346 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 3.2% | 4.7% | 6.3% | 7.9% | 9.5% | 11.1% | 12.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 14.2% | 15.8% | 17.4% | 18.9% | 20.5% | 22.1% | 23.7% | 25.3% | 26.8% | 28.4% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 347 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.3% | 9.5% | 12.6% | 15.8% | 18.9% | 22.1% | 25.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.4% | 31.6% | 34.7% | 37.9% | 41.1% | 44.2% | 47.4% | 50.5% | 53.7% | 56.8% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 348 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 19 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3% | 3.3% | 3.7% | 7.4% | 11.1% | 14.7% | 18.4% | 22.1% | 25.8% | 29.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 33.2% | 36.8% | 40.5% | 44.2% | 47.9% | 51.6% | 55.3% | 58.9% | 62.6% | 66.3% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 349 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.7% | 3% | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.2% | 4.5% | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 350 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 10.5% | 12% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13.5% | 15% | 16.5% | 18% | 19.5% | 21% | 22.5% | 24% | 25.5% | 27% | 28.5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 351 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | 48% | 51% | 54% | 57% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 352 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 20 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.4% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 7% | 10.5% | 14% | 17.5% | 21% | 24.5% | 28% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31.5% | 35% | 38.5% | 42% | 45.5% | 49% | 52.5% | 56% | 59.5% | 63% | 66.5% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 353 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.7% | 4% | 4.3% | 4.6% | 4.9% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 354 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 2.9% | 4.3% | 5.7% | 7.1% | 8.6% | 10% | 11.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.9% | 14.3% | 15.7% | 17.1% | 18.6% | 20% | 21.4% | 22.9% | 24.3% | 25.7% | 27.1% | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 355 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.7% | 8.6% | 11.4% | 14.3% | 17.1% | 20% | 22.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25.7% | 28.6% | 31.4% | 34.3% | 37.1% | 40% | 42.9% | 45.7% | 48.6% | 51.4% | 54.3% | 57.1% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 356 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 21 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.7% | 1% | 1.3% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 3% | 3.3% | 6.7% | 10% | 13.3% | 16.7% | 20% | 23.3% | 26.7% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30% | 33.3% | 36.7% | 40% | 43.3% | 46.7% | 50% | 53.3% | 56.7% | 60% | 63.3% | 66.7% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 357 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.5% | 2.7% | 3% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.6% | 4.9% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 358 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 2.7% | 4.1% | 5.5% | 6.8% | 8.2% | 9.5% | 10.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12.3% | 13.6% | 15% | 16.4% | 17.7% | 19.1% | 20.5% | 21.8% | 23.2% | 24.5% | 25.9% | 27.3% | 28.6% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 359 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.5% | 8.2% | 10.9% | 13.6% | 16.4% | 19.1% | 21.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.5% | 27.3% | 30% | 32.7% | 35.5% | 38.2% | 40.9% | 43.6% | 46.4% | 49.1% | 51.8% | 54.5% | 57.3% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 360 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 22 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.6% | 2.9% | 3.2% | 6.4% | 9.5% | 12.7% | 15.9% | 19.1% | 22.3% | 25.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 28.6% | 31.8% | 35% | 38.2% | 41.4% | 44.5% | 47.7% | 50.9% | 54.1% | 57.3% | 60.5% | 63.6% | 66.8% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 361 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.3% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.7% | 5% | 5.2% | 5.5% | 5.7% | 6% | 6% | 6% | 6% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 362 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.6% | 3.9% | 5.2% | 6.5% | 7.8% | 9.1% | 10.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 11.7% | 13% | 14.3% | 15.7% | 17% | 18.3% | 19.6% | 20.9% | 22.2% | 23.5% | 24.8% | 26.1% | 27.4% | 28.7% | 30% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 363 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 2.6% | 5.2% | 7.8% | 10.4% | 13% | 15.7% | 18.3% | 20.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23.5% | 26.1% | 28.7% | 31.3% | 33.9% | 36.5% | 39.1% | 41.7% | 44.3% | 47% | 49.6% | 52.2% | 54.8% | 57.4% | 60% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 364 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 23 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.4% | 2.7% | 3% | 6.1% | 9.1% | 12.2% | 15.2% | 18.3% | 21.3% | 24.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27.4% | 30.4% | 33.5% | 36.5% | 39.6% | 42.6% | 45.7% | 48.7% | 51.7% | 54.8% | 57.8% | 60.9% | 63.9% | 67% | 70% | 70% | 70% | 70% |

## Tabela numer 365 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.3% | 3.5% | 3.8% | 4% | 4.3% | 4.5% | 4.8% | 5% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6% | 6% |

## Tabela numer 366 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1% | 1.2% | 1.3% | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 8.8% | 10% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 11.3% | 12.5% | 13.8% | 15% | 16.3% | 17.5% | 18.8% | 20% | 21.3% | 22.5% | 23.8% | 25% | 26.3% | 27.5% | 28.8% | 30% | 30% | 30% |

## Tabela numer 367 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1% | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 2% | 2.3% | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 32.5% | 35% | 37.5% | 40% | 42.5% | 45% | 47.5% | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60% | 60% | 60% |

## Tabela numer 368 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 24 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.9% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.3% | 2.6% | 2.9% | 5.8% | 8.8% | 11.7% | 14.6% | 17.5% | 20.4% | 23.3% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26.3% | 29.2% | 32.1% | 35% | 37.9% | 40.8% | 43.8% | 46.7% | 49.6% | 52.5% | 55.4% | 58.3% | 61.3% | 64.2% | 67.1% | 70% | 70% | 70% |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 369 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.2% | 2.4% | 2.6% | 2.9% | 3.1% | 3.4% | 3.6% | 3.8% | 4.1% | 4.3% | 4.6% | 4.8% | 5% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% | 6% |

## Tabela numer 370 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.4% | 3.6% | 4.8% | 6% | 7.2% | 8.4% | 9.6% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.8% | 12% | 13.2% | 14.4% | 15.6% | 16.8% | 18% | 19.2% | 20.4% | 21.6% | 22.8% | 24% | 25.2% | 26.4% | 27.6% | 28.8% | 30% | 30% |

## Tabela numer 371 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.7% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 4.8% | 7.2% | 9.6% | 12% | 14.4% | 16.8% | 19.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 21.6% | 24% | 26.4% | 28.8% | 31.2% | 33.6% | 36% | 38.4% | 40.8% | 43.2% | 45.6% | 48% | 50.4% | 52.8% | 55.2% | 57.6% | 60% | 60% |

## Tabela numer 372 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 25 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.6% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.7% | 2% | 2.2% | 2.5% | 2.8% | 5.6% | 8.4% | 11.2% | 14% | 16.8% | 19.6% | 22.4% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25.2% | 28% | 30.8% | 33.6% | 36.4% | 39.2% | 42% | 44.8% | 47.6% | 50.4% | 53.2% | 56% | 58.8% | 61.6% | 64.4% | 67.2% | 70% | 70% |

## Tabela numer 373 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/10 - 1/3 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2.1% | 2.3% | 2.5% | 2.8% | 3% | 3.2% | 3.5% | 3.7% | 3.9% | 4.2% | 4.4% | 4.6% | 4.8% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6% |

## Tabela numer 374 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1/3 - 1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.2% | 2.3% | 3.5% | 4.6% | 5.8% | 6.9% | 8.1% | 9.2% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10.4% | 11.5% | 12.7% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.3% | 18.5% | 19.6% | 20.8% | 21.9% | 23.1% | 24.2% | 25.4% | 26.5% | 27.7% | 28.8% | 30% |

## Tabela numer 375 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | >1/2 | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.2% | 0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 4.6% | 6.9% | 9.2% | 11.5% | 13.8% | 16.2% | 18.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 20.8% | 23.1% | 25.4% | 27.7% | 30% | 32.3% | 34.6% | 36.9% | 39.2% | 41.5% | 43.8% | 46.2% | 48.5% | 50.8% | 53.1% | 55.4% | 57.7% | 60% |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 376 - Tytoń jasny

| Faza rozwoju | | | 26 - Średnia liczba liści | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Całkowice zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0.3% | 0.5% | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.6% | 1.9% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 5.4% | 8.1% | 10.8% | 13.5% | 16.2% | 18.8% | 21.5% | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 24.2% | 26.9% | 29.6% | 32.3% | 35% | 37.7% | 40.4% | 43.1% | 45.8% | 48.5% | 51.2% | 53.8% | 56.5% | 59.2% | 61.9% | 64.6% | 67.3% | 70% |

## 89. Winogrono - konsumpcyjne

### Tabela numer 1841 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1842 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1843 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1844 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1845 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6771 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

### Tabela numer 2971 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2972 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2973 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2974 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2975 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5018 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5019 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

## Tabela numer 5020 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

## Tabela numer 5021 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5022 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5656 - Winogrono - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 90 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## 90. Wiśnia - konsumpcyjne

### Tabela numer 1846 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 1847 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 1848 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 1849 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 1850 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 6766 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

### Tabela numer 2976 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 2977 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 2978 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 2979 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 2980 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5023 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | 1–3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

### Tabela numer 5024 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Więcej niż 3 zagłębienia | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |

### Tabela numer 5025 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce z przeciętą zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 73 |

### Tabela numer 5026 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce zdeformowane lub z przeciętą nie zagojoną skórką | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5027 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Wykształcone owoce | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Owoce ścięte – leżące na ziemi | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 5651 - Wiśnia - konsumpcyjne

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa: Pąki, kwiaty, zawiązki | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | | | Przyczyna | | | Zniszczenie pąków, kwiatów, zawiązków | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 34 | 51 | 68 | 80 | 80 |

## 91. Wyka

### Tabela numer 2019 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2020 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 2021 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 2022 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 2023 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 2024 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 2025 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 2026 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2027 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2028 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2029 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 2030 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 2031 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 2032 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2033 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2034 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 2035 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2036 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2037 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2038 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2039 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2040 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 2041 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6448 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6449 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 6450 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 6451 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 6452 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6453 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 6454 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 6455 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6456 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6457 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 6458 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 6459 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 6460 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6461 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6462 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6463 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 6464 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6465 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6466 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 6467 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6468 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6469 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 6470 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3149 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3150 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 3151 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 3152 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

## Tabela numer 3153 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3154 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 3155 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 3156 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3157 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3158 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 3159 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 3160 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 3161 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

## Tabela numer 3162 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3163 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3164 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 3165 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3166 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3167 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 3168 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3169 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3170 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 3171 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5196 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie 00 - suche nasiona; 09 - kiełek przebija się nad powierzchnię gleby | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5197 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 89 | 100 |

## Tabela numer 5198 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 43 | 45 |

## Tabela numer 5199 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5200 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój liści, rozwój głównego pędu 10 - liścienie całkowicie rozwiniete; 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 5201 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 87 |

## Tabela numer 5202 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 41 | 46 | 49 | 53 |

## Tabela numer 5203 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5204 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 21-29, OPIS: Rozwój pędów bocznych 21 - widoczny pierwszy pęd boczny; 29 (2N9) zakończenie rozwoju wegetatywnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5205 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 95 |

## Tabela numer 5206 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 43 |

## Tabela numer 5207 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |

## Tabela numer 5208 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 | 86 | 92 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5209 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5-6 wg skali BBCH, KOD: 51-69, OPIS: Rozwój kwiatostanu, Kwitnienie 51 - widoczne pierwsze pąki; 69 - koniec kwitnienia, widoczne pierwsze strąki | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5210 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5211 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 |

## Tabela numer 5212 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

## Tabela numer 5213 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5214 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 70-79, OPIS: Rozwój strąków i nasion 70 - pierwszy strąk osiąga typową długość; 79 - prawie wszystkie strąki osiągają typowa długość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |

## Tabela numer 5215 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5216 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5217 - Wyka

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 14 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5218 - Wyka

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 80-89, OPIS: Dojrzewanie strąków i nasion 80 - pierwszy dojrzały strąk, 89 - pełna dojrzałość, wiekszość strąków dojrzałych nasiona suche, twarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 92. Ziemniak średniopóźny i późny

### Tabela numer 1851 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

### Tabela numer 1852 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

### Tabela numer 1853 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |

### Tabela numer 1854 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

### Tabela numer 1855 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |

### Tabela numer 1856 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 1857 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

### Tabela numer 1858 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1859 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1860 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1861 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 1862 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

## Tabela numer 1863 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1864 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1865 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 1866 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1867 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |

## Tabela numer 1868 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1869 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

## Tabela numer 1870 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1871 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 1872 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1873 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1874 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1875 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 1876 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6280 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

## Tabela numer 6281 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6282 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 6283 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6284 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |

## Tabela numer 6285 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6286 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6287 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

## Tabela numer 6288 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6289 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6290 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 6291 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6292 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6293 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6294 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 6295 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6296 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |

## Tabela numer 6297 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6298 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

## Tabela numer 6299 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6300 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 6301 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6302 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6303 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6304 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 6305 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oczętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 2981 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

## Tabela numer 2982 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 2983 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 2984 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 2985 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |

## Tabela numer 2986 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Oczętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2987 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 2988 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

## Tabela numer 2989 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 2990 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2991 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 2992 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

## Tabela numer 2993 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2994 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 2995 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 2996 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2997 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |

## Tabela numer 2998 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2999 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

## Tabela numer 3000 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3001 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 3002 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3003 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3004 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3005 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Tabela numer 3006 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5028 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

## Tabela numer 5029 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5030 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |

## Tabela numer 5031 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 5032 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |

## Tabela numer 5033 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5034 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5035 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

## Tabela numer 5036 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5037 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5038 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |

## Tabela numer 5039 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |

## Tabela numer 5040 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5041 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5042 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

## Tabela numer 5043 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5044 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |

## Tabela numer 5045 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5046 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

## Tabela numer 5047 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5048 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

### Tabela numer 5049 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

### Tabela numer 5050 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

### Tabela numer 5051 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 5052 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Tabela numer 5053 - Ziemniak średniopóźny i późny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 48-49, OPIS: Tworzenie bulw 49 -95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 93. Ziemniak wczesny i średniowczesny

### Tabela numer 1877 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

### Tabela numer 1878 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

### Tabela numer 1879 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1880 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 1881 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |

## Tabela numer 1882 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 1883 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 1884 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 1885 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 1886 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 1887 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 1888 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 1889 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1890 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 |

## Tabela numer 1891 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |

## Tabela numer 1892 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 1893 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 1894 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

## Tabela numer 1895 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1896 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 1897 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1898 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 1899 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1900 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1901 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6306 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

## Tabela numer 6307 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6308 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 6309 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6310 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |

## Tabela numer 6311 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 6312 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6313 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6314 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6315 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 6316 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 6317 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6318 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 6319 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 |

## Tabela numer 6320 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |

## Tabela numer 6321 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 6322 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 6323 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6324 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6325 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 6326 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6327 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 6328 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6329 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6330 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 3007 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

## Tabela numer 3008 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 3009 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3010 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 3011 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |

## Tabela numer 3012 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 3013 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 3014 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Tabela numer 3015 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 3016 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 3017 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 3018 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 3019 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3020 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 |

## Tabela numer 3021 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |

## Tabela numer 3022 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 3023 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 3024 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

## Tabela numer 3025 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3026 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 3027 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3028 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Tabela numer 3029 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3030 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 3031 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5054 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |

## Tabela numer 5055 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 0 wg skali BBCH, KOD: 00-09, OPIS: Kiełkowanie (formowanie pędów) 00 - bulwa w stanie spoczynku; 09 - pędy przedostają się na powierzchnię redliny | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5056 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |

## Tabela numer 5057 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 5058 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1-2 wg skali BBCH, KOD: 10-29, OPIS: Rozwój liści, rozwój pędów bocznych na głównym pędzie | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |

## Tabela numer 5059 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |

## Tabela numer 5060 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 5061 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5062 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3 wg skali BBCH, KOD: 31-35, OPIS: wzrost pędów, zakrywanie międzyrzędzi (od 10 do 50%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5063 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |

## Tabela numer 5064 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

## Tabela numer 5065 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |

## Tabela numer 5066 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4-5 wg skali BBCH, KOD: 40-59, OPIS: Zawiązywanie bulw - 40-41; rozwój kwiatostanów -51 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Tabela numer 5067 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 |

## Tabela numer 5068 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |

## Tabela numer 5069 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |

## Tabela numer 5070 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4; 6 wg skali BBCH, KOD: 42-45;60-69, OPIS: tworzenie bulw - 42-45; Kwitnienie 60-69 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |

## Tabela numer 5071 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 5072 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

### Tabela numer 5073 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

### Tabela numer 5074 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 42-47, OPIS: Tworzenie bulw 45 - bulwy isiągaja 50% typowej masy | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

### Tabela numer 5075 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

### Tabela numer 5076 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 5077 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

### Tabela numer 5078 - Ziemniak wczesny i średniowczesny

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 4 wg skali BBCH, KOD: 46-49, OPIS: Tworzenie bulw 49-95% bulw całkowicie pokryte skórką | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 94. Żyto hybrydowe

### Tabela numer 2185 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 79 | 90 | 100 |

### Tabela numer 2186 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2187 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 63 | 68 | 73 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 2188 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 2189 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 83 | 89 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2190 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 |

## Tabela numer 2191 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41 |

## Tabela numer 2192 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 2193 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2194 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 81 | 87 | 90 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 2195 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 |

## Tabela numer 2196 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 2197 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 2198 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2199 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 74 | 80 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 |

## Tabela numer 2200 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 2201 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 2202 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 2203 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2204 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 2205 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 2206 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5529 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 2207 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 2208 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 5532 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8769 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8770 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7862 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7863 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7864 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7865 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7866 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7867 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7868 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7869 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7870 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8050 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7871 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7872 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7873 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7874 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7875 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6614 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 79 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6615 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 6616 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 63 | 68 | 73 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 6617 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 6618 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 83 | 89 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6619 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 |

## Tabela numer 6620 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41 |

## Tabela numer 6621 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6622 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6623 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 81 | 87 | 90 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 6624 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 |

## Tabela numer 6625 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 6626 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6627 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6628 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 74 | 80 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 |

## Tabela numer 6629 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 6630 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6631 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6632 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6633 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 6634 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6635 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6717 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6636 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6637 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6718 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8775 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8776 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7904 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7905 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7906 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7907 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7908 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7909 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7910 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7911 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7912 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8053 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7913 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7914 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7915 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7916 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7917 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3315 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 79 | 90 | 100 |

## Tabela numer 3316 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 3317 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 63 | 68 | 73 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 3318 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3319 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 83 | 89 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 3320 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 |

## Tabela numer 3321 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41 |

## Tabela numer 3322 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3323 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3324 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 81 | 87 | 90 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 3325 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 |

## Tabela numer 3326 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 3327 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 3328 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3329 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 74 | 80 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 |

## Tabela numer 3330 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 3331 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3332 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3333 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3334 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 3335 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 3336 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5530 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3337 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3338 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 5533 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8771 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8772 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7876 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7877 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7878 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7879 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7880 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7881 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7882 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7883 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7884 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8051 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7885 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7886 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7887 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7888 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7889 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5362 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 79 | 90 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5363 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |

## Tabela numer 5364 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 63 | 68 | 73 | 85 | 90 | 100 |

## Tabela numer 5365 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 |

## Tabela numer 5366 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | 77 | 83 | 89 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 5367 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 65 | 69 | 73 |

## Tabela numer 5368 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 38 | 41 |

## Tabela numer 5369 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5370 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5371 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 81 | 87 | 90 | 93 | 98 | 100 |

## Tabela numer 5372 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5373 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 5374 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5375 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5376 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 63 | 69 | 74 | 80 | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 |

## Tabela numer 5377 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 5378 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5379 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5380 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5381 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

## Tabela numer 5382 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5383 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5531 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5384 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5385 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 5534 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8773 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8774 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7890 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7891 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7892 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7893 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7894 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7895 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7896 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7897 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7898 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8052 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7899 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7900 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7901 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7902 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7903 - Żyto hybrydowe

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 95. Żyto jare - ziarno

### Tabela numer 1902 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

### Tabela numer 1903 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

### Tabela numer 1904 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

### Tabela numer 1905 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

### Tabela numer 1906 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

### Tabela numer 1907 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

### Tabela numer 1908 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1909 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1910 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1911 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1912 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 1913 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1914 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1915 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1916 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 1917 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1918 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1919 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1920 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1921 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 1922 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 1923 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5511 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1924 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1925 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 5514 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8753 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8754 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7750 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7751 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7752 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7753 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7754 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7755 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7756 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7757 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7758 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8054 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7759 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7760 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7761 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7762 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7763 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6331 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6332 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 6333 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6334 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 6335 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 6336 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 6337 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 6338 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6339 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6340 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 6341 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 6342 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 6343 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6344 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6345 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 6346 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 6347 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6348 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6349 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6350 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 6351 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6352 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6713 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6353 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6354 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6714 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8759 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8760 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7792 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7793 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7794 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7795 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7796 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7797 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7798 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7799 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7800 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8057 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7801 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7802 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7803 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7804 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7805 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3032 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 3033 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 3034 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 3035 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 3036 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 3037 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 3038 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 3039 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3040 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3041 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 3042 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 3043 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 3044 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 3045 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3046 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 3047 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 3048 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3049 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3050 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3051 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 3052 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 3053 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5512 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3054 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 3055 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 5515 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8755 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8756 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7764 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7765 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7766 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7767 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7768 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7769 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7770 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7771 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7772 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8055 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7773 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7774 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7775 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7776 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7777 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5079 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5080 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 5081 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 5082 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 5083 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5084 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 5085 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 5086 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5087 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5088 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5089 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 5090 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 5091 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5092 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5093 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5094 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 5095 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5096 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5097 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5098 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 5099 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5100 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5513 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5101 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5102 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5516 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8757 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8758 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7778 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7779 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7780 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7781 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7782 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7783 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7784 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

### Tabela numer 7785 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

### Tabela numer 7786 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Tabela numer 8056 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7787 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7788 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

### Tabela numer 7789 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7790 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

### Tabela numer 7791 - Żyto jare - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## 96. Żyto ozime - ziarno

### Tabela numer 1926 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1927 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 1928 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 1929 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 1930 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 1931 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 1932 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 1933 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 1934 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1935 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 1936 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1937 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 1938 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 1939 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1940 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 1941 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 1942 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 1943 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 1944 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1945 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

## Tabela numer 1946 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 1947 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5520 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 1948 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 1949 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 5523 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8761 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8762 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7806 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7807 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7808 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7809 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7810 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7811 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7812 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7813 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7814 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8058 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7815 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7816 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7817 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7818 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7819 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Grad | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6355 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 6356 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 6357 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 6358 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 6359 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 6360 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 6361 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6362 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 6363 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w źdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6364 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 6365 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 6366 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 6367 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 6368 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 6369 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 6370 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 6371 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 6372 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 6373 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6374 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

## Tabela numer 6375 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 6376 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 6715 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 6377 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 6378 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 |

## Tabela numer 6716 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8767 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8768 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7848 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7849 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7850 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7851 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7852 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7853 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7854 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7855 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7856 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 8061 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7857 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7858 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7859 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7860 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7861 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Przymrozek wiosenny | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3056 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 3057 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 3058 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3059 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 3060 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 3061 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 3062 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 3063 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 3064 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3065 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 3066 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 3067 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 3068 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3069 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3070 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 3071 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 3072 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 3073 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 3074 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 3075 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

## Tabela numer 3076 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 3077 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5521 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 3078 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 3079 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 5524 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8763 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8764 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7820 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7821 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7822 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7823 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7824 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7825 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7826 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7827 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7828 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8059 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7829 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7830 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7831 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7832 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7833 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Huragan | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5103 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 61 | 68 | 75 | 84 | 92 | 100 |

## Tabela numer 5104 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 1 wg skali BBCH, KOD: 10-19, OPIS: Rozwój lisci 10 - szpilkowanie, 11 - faza 1 liscia, 19 - faza 9 lub wiecej liści | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 |

## Tabela numer 5105 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 |

## Tabela numer 5106 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 2 wg skali BBCH, KOD: 20-29, OPIS: Krzewienie 21 - poczatek fazy krzewienia, widoczne 1 rozkrzewienie; 29 - koniec fazy krzewienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 |

## Tabela numer 5107 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 83 | 87 | 92 |

## Tabela numer 5108 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 |

## Tabela numer 5109 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 |

## Tabela numer 5110 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 5111 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 3-4 wg skali BBCH, KOD: 30-49, OPIS: Strzelanie w żdźbło, rozwój kłosa w pochwie liściowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5112 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 70 | 75 | 80 | 84 | 90 | 95 |

## Tabela numer 5113 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 53 | 56 | 59 |

## Tabela numer 5114 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |

## Tabela numer 5115 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 5116 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 5 wg skali BBCH, KOD: 51-59, OPIS: Kłoszenie, wyłanianie się kwiatostanu z pochwy liścia flagowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Krzywe kłosy | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5117 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 46 | 50 | 55 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 83 | 89 | 93 |

## Tabela numer 5118 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |

## Tabela numer 5119 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 |

## Tabela numer 5120 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 6wg skali BBCH, KOD: 61-69, OPIS: Kwitnienie, początek, pełnia i koniec kwitnienia | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

## Tabela numer 5121 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 5122 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 |

## Tabela numer 5123 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Tabela numer 5124 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

## Tabela numer 5522 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-77, OPIS: Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 5125 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 |

## Tabela numer 5126 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

## Tabela numer 5525 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-89, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej - dojrzałość pełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8765 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 8766 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7834 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

warta.

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7835 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |

## Tabela numer 7836 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |

## Tabela numer 7837 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7838 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 71-72, OPIS: Osadzanie ziarna - Rozwój ziarniaków | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Tabela numer 7839 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7840 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

## Tabela numer 7841 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Liście - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |

## Tabela numer 7842 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ocętkowanie pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Tabela numer 8060 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 7 wg skali BBCH, KOD: 73-77, OPIS: Mleczna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7843 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

# NORMY

do ustalania wysokości szkód w uprawach

## Tabela numer 7844 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Złomy pędów | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |

## Tabela numer 7845 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 83-87, OPIS: Dojrzewanie ziarniaków; początek dojrzałości woskowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7846 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Rośliny - Całkowicie zniszczone | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

## Tabela numer 7847 - Żyto ozime - ziarno

| Faza rozwoju | | | Faza rozwojowa 8 wg skali BBCH, KOD: 89, OPIS: Pełna dojrzałość | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Część rośliny | | | Ziarno - Całkowicie zniszczone / wybite | | | | | | | Przyczyna | | | Powódź / Deszcz Nawalny | | | | | | |
| 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Dla upraw nieujętych w normach ubytek plonu głównego ustalony zostanie w oparciu o istniejące normy do ustalania wysokości szkody w uprawach dla roślin o podobnej fizjologii i morfologii.